

攀援半灌木，高 1—1.5 米；茎线形，圆柱状或略具条纹，黄绿色，无毛或具微长柔。叶薄膜质，线形或线状披针形，长 7 厘米，宽 7 毫米，顶端急尖；叶柄长 7 毫米。叶面略具疏柔毛，叶背无毛。花仅 1 朵；花梗长达 1 厘米，基部有线形的小苞片，长 2—4 毫米；花全长 4—4.3 厘米；花萼裂片线状披针形，长 5—7 毫米，顶端渐尖，无毛或略有缘毛，花萼内面基部有腺体 16—20 个；花冠筒长 2.6—2.8 厘米，基部斜椭圆形，直径约 6 毫米，裂片长 1.2—1.4 厘米，顶端粘合；副花冠外轮杯状，裂片至中部合生，三角形，顶端有硬缘毛，内轮舌状片长圆状线形；花粉块长圆形，顶端有 1 透明的膜片。花期 6 月。

产于四川西部。生长于海拔 1900—2600 米山地林中。模式标本采自四川西部。

11. 长叶吊灯花(中国高等植物图鉴)

Ceropegia dolichophylla Schltr. in Not. Bot. Gard. Edinb. **8**: 17. 1913; Tsiang in Sunyatsenia **4**: 92, Pl. 26. 1939; 中国高等植物图鉴, **3**: 521, 图 4994. 1974. — *C. dolichophylla* Schltr. var. *purpureo-barbata* W. W. Sm. in Not. Bot. Gard. Edinb. **12**: 198. 1920; Tsiang l. c. 92. — *C. dolichophylla* Schltr. var. *brachyloba* Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien Math. Nat. **61**: 167. 1924, et Symb. Sin. **7**: 999. 1936; Tsiang l. c. 92. — *C. profundorum* Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien Math. Nat. **60**: 137. 1923, et Symb. Sin. **7**: 999. 1936. — *C. longifolia* Wall. ssp. *sinensis* H. Huber var. *sinensis*; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 42. 1957, nom. illeg.

根茎肉质，细长丛生；茎柔细，缠绕，长约 1 米。叶对生，膜质，线状披针形，长 5—12 厘米，宽 0.5—2 厘米，顶端渐尖。花单生或 2—7 朵集生；花萼裂片线状披针形；花冠褐红色，裂片顶端粘合；副花冠 2 轮，外轮具 10 齿，内轮具 5 舌状片，比外轮长 1 倍；花粉块单独，直立。蒴果狭披针形，长约 10 厘米，直径 5 毫米。花期 7—8 月，果期 9 月。

产于四川、贵州、云南和广西等省区。生长于海拔 500—1000 米山地密林中。模式标本采自四川。

12. 吊灯花(海南植物志) 图版 218

Ceropegia trichantha Hemsl. in Journ. Bot. **23**: 286. 1885, et in Journ. Linn. Soc. Bot. **26**: 117. 1889; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Misc. Inf. a. s. **10**: 173. 1912; Tsiang in Sunyatsenia **4**: 93. 1939, in Acta Phytotax. Sinica **10**: 40. 1965; H. Huber in Mem. Soc. Brot. **12**: 53. 1957, pro syn. sub *C. lucida* Wall; 中国高等植物图鉴,