

Formos. 87. 1916, nom. nud. — *E. alsinoides* (Linn.) Linn. form. *rotundifolia* (Hayata) Yamamoto in Suppl. Ic. Pl. Formos 1: 40. 1925, descr.

与原变种不同在于叶卵状心形或圆形,长7—13毫米,宽6—10毫米,先端钝,具小短尖头,基部近心形或圆形,两面极密被黄褐色长柔毛,全缘;柄极短,长约1毫米。

产我国台湾省。分布于菲律宾。

3. 盾苞藤属 *Neuropeltis* Wall.

Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey et Wall. 2: 43. 1824.

高大的缠绕藤本。叶具柄,椭圆形,卵圆形或长圆形,羽状脉,全缘,草质或革质。花小,腋生总状花序或近于顶生的圆锥花序。被锈色绒毛;苞片最初小,贴生于花梗上,果时极增大,宽椭圆形至圆形,具网脉,干膜质。小苞片小,被毛;萼片5,近等大,近圆形,果时几不增大;花冠整齐,辐状至宽钟形,白色或淡红色,深5裂,花蕾时内向镊合状至镊合状;雄蕊5,着生于花冠近基部,外伸或内藏;花丝丝状,无毛或基部被柔毛;花药长圆形,花粉粒无刺;子房被毛,完全或不完全2室,4胚珠;花柱2,分离,短;柱头盾状、浅裂、肾形或马蹄形。蒴果小,球形,与宿存萼片同着生于增大苞片近中部,无毛,4瓣裂;种子通常1粒,球形,平滑,无毛,暗黑色。

约11种,2种在热带非洲西部,4种在刚果(利),1种在加蓬,4种星散分布在热带亚洲,从印度西海岸至缅甸南部、马来半岛、中南半岛东南部。我国1种,产云南、广东(海南)。

1. 盾苞藤 图版2: 5—8

Neuropeltis racemosa Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey et Wall. 2: 44. 1824, Cat. n. 1322. 1829; Choisy in DC. Prodr. 9: 437. 1845; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 225. 1883; v. Ooststr. in Blumea 3: 81. 1938, et ibid. 5(1): 269. f. 2. a—b. 1942, et in Fl. Males. ser. 1, 4(4): 400. f. 7. a—c. 1953; 吴征镒、李锡文,云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 99. 1965; 中国高等植物图鉴 3: 525. 图 5003. 1974; 海南植物志 3: 475. 图 866. 1974. — *Sinomerrillia bracteata* Hu in Bull. Fan Mem. Inst. Biol. 8: 48. 1937, — *Erycibe integripetala* Merr. et Chun in Sunyatsenia. 5: 174. 1940., syn. nov. — *N. integripetala* (Merr. et Chun) C. Y. Wu, 吴征镒、李锡文,云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 99. 1965., quoad pl. Chin., syn. *N. indochinensis* v. Ooststr. exclud.

高大的缠绕藤本,幼枝或多或少被锈褐色绒毛,老枝无毛。叶椭圆形或长圆形,长6—12厘米,宽3—6.5厘米,先端锐尖或短渐尖,基部宽楔形或渐狭,革质,两面无毛,或被稀疏的柔毛;侧脉7—10对,网脉在叶面明显;叶柄长10—15毫米,或稍长。总状花序腋生,单1或2—4个簇生,被褐色绒毛,较叶短,长3—6厘米,或稍长;花梗长2—2.5毫米;