

苞片紧贴萼下，卵形或卵状披针形，具明显的尖头，长2—3毫米，果时极增大，宽椭圆形至圆形，顶端微缺及具小尖头，基部微缺或圆形，无毛，长(3)—4—4.5(—5)厘米，干膜质，具网脉；两个外萼片圆形或宽稍大于长，长2—2.5毫米，3个内萼片宽大于长，长1.75—2毫米，外面被柔毛；花冠宽钟形，白色，长约5毫米，深5裂，裂片较花冠管长，先端钝，外面被疏柔毛；雄蕊5，花丝丝状，长3毫米，基部具毛垫；花药椭圆形，长1.5毫米；子房卵形，被毛；花柱2，短，柱头宽约1毫米。蒴果球形，径5—6毫米。花期6—12月，果期延至翌年4月。

产云南(西双版纳)，广东(海南)。生于海拔400—1100米的沟谷密林及灌丛中。分布于缅甸(典那沙冷)至马来半岛西北部及加里曼丹岛(?)

吴征镒根据侯宽昭 73495 号标本将 *Erycibe integripetala* Merr. et Chun 和 *Neuropeltis indochinensis* v. *Ooststr.* in *Blumea* 5(3):270, f. 2, e—f. 1942 组合为 *Neuropeltis integripetala* (Merr. et Chun) C. Y. Wu, 1965. 经检查侯宽昭 73495 号标本，花丝基部有少许毛垫，花柱短，不长过子房，此特征与侯宽昭同号的另一标本以及海南各地标本是一致的，应为 *N. racemosa* Wall., 因此，我们认为，我国广东海南仅产 *N. racemosa* Wall. 1 种。

4. 丁公藤属* *Erycibe* Roxb.

Roxb. Pl. Corom. 2: 31. t. 159. 1798; DC. in DC. Prodr.

9: 463. 1845, pro fam.; Hoogl. in Fl. Males. ser. 1, 4(4);

404—431. 1953; id. in *Blumea* 7(2): 342—361. 1953.

木质大藤本或攀援灌木，极少为小乔木，无毛或被绒毛，毛为单毛或有时叉状分枝。叶卵形或狭长圆形，渐尖，全缘，革质；叶柄短。花序总状或圆锥状，顶生或腋生；苞片通常很小，早落；花小；萼片5，近相等，圆形或椭圆形，革质，宿存且贴近果的基部；花冠白色或黄色，钟状，花冠管短，花冠深5裂，每裂片具一近于三角形的外面被毛的瓣中带和2片质地较薄的小裂片；雄蕊5，近于内藏，着生于花冠基部稍上方，花丝略呈三角形或侧面凹，花药顶端钝或渐尖，基部心形，有时两端截形至微凹；花粉粒平滑；花盘不明显；子房球形或椭圆形，1室，4胚珠；花柱几无，柱头半球形、球形或圆锥状，贴生于子房，通常具有5条或10条直的或稍扭曲的脊，或冠状、漏斗状贴近子房，几与子房直径相等。浆果稍肉质，内有1种子，具膜质种皮，通常和果皮贴生，胚乳不完全，不规则地伸入肉质具折的子叶间，胚根下位，伸入子叶间。

约66种，产热带亚洲，自日本南部和琉球、中国南部各省、中南半岛、印度、斯里兰卡，经马来亚、菲律宾至澳大利亚的昆士兰北部。我国产11种，主要分布在台湾、

* 属的异名：麻辣仔藤属（云南热带亚热带植物区系研究报告，第一集，1965年）麻辣仔属（拉汉种子植物名称，第二版，1974年）。

广东、广西和云南。

分 种 检 索 表

1. 小枝及叶背面极密被锈色或栗色柔毛。
 2. 圆锥花序顶生及腋生, 比叶短得多或顶生圆锥花序, 结果时有的比叶长; 叶椭圆形至长圆状椭圆形, 长 15—18 厘米…………… 1. 毛叶丁公藤 *E. hainanensis* Merr.
 2. 圆锥花序顶生, 比叶长得多; 叶椭圆形, 长 6.5—9 厘米…………… 2. 锈毛丁公藤 *E. ferruginea* C. Y. Wu
1. 小枝无毛或被稍密的柔毛, 叶两面无毛或近于无毛。
 3. 圆锥花序疏散, 通常顶生, 有时腋生, 多花, 花序轴伸长, 长 5—24 厘米。
 4. 花冠裂片有小锯齿。叶较大, 长圆形, 披针状长圆形或椭圆形, 长 7—18 厘米, 背面被短柔毛或有时近无毛, 有侧脉 6—7 对; 小枝被锈色短柔毛…………… 3. 锥序丁公藤 *E. subspicata* Wall. ex G. Don
 4. 花冠裂片近全缘或有波状小圆齿。叶较小, 长圆状倒卵形, 长 5—8 厘米, 两面无毛, 有侧脉 3—4 对; 小枝密被锈色短柔毛…………… 4. 多花丁公藤 *E. myriantha* Merr.
 3. 总状或圆锥花序, 顶生和腋生, 腋生的通常比叶短很多。
 5. 花序总状腋生, 少花, 长 1.5—2 厘米; 叶椭圆形或长圆状椭圆形, 长 8—15 厘米, 宽 4—7 厘米, 两面无毛, 干时淡黄褐色, 略带淡红色…………… 5. 疏花丁公藤 *E. oligantha* Merr. et Chun
 5. 花序腋生和顶生, 多花, 长 2—11 厘米或更长。
 6. 花冠裂片边缘撕裂状; 叶片长椭圆形或长圆形, 长 8—18 厘米, 宽 3.5—6 厘米, 两面无毛, 干后变灰绿色…………… 6. 粉绿丁公藤 *E. glaucescens* Wall. ex Choisy
 6. 花冠裂片边缘全缘或浅波状或啮蚀状。
 7. 叶片质地厚, 革质或厚革质。
 8. 叶卵状椭圆形至长圆状椭圆形, 顶端骤然渐尖; 花冠裂片边缘啮蚀状。
 9. 中脉和侧脉在叶面下陷, 在背面稍突起, 网脉于两面下陷, 在背面尤明显; 果椭圆形…………… 7. 九来尤 *E. elliptilimba* Merr. et Chun
 9. 中脉在叶面下陷, 侧脉在叶面不明显; 网脉在背面稍微突起; 浆果球形…………… 9. 光叶丁公藤 *E. schmidtii* Craib
 8. 叶椭圆形或倒长卵形, 长 6.5—9 厘米, 顶端钝圆或钝; 花冠白色, 边缘浅波状; 浆果卵状椭圆形…………… 8. 丁公藤 *E. obtusifolia* Benth.
 7. 叶片质地较薄, 纸质。
 10. 叶椭圆形或长圆状椭圆形, 侧脉在叶面很不明显, 在背面稍突起, 网脉几乎不显著; 花冠裂片长圆状卵形; 子房球形…………… 10. 瑶山丁公藤 *E. sinii* How
 10. 叶卵形或圆卵形, 侧脉和网脉在两面突起; 花冠裂片长椭圆形或长圆形; 子房圆柱形…………… 11. 台湾丁公藤 *E. henryi* Prain

1. 毛叶丁公藤(海南植物志) 海南麻辣子藤(中国高等植物图鉴)

Erycibe hainanensis Merr. in Philip. Journ. Sci. 21: 353. 1922; id. in Lingnan Sci. Journ. 5: 153. 1927; Masamune, Fl. Kainant. 272. 1943; How in Sunyatsenia 6 (3—4): 223. 1946, descr. add.; Hoogl. in Blumea 7(2): 349.