

mune, Fl. Kainant. 272. 1943; How in Sunyatsenia 6; 227. 1946, descr. add., Hoogl. in Fl. Males. ser. 1, 4(4): 419. 1953; id. in Blumea 7(2): 346. 1953; 海南植物志 3: 477. 图 868. 1974.——*E. paniculata* auct. non Roxb.; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gen. Indo-Chine 4: 305. 1915.——*E. fecunda* Kerr in Kew Bull. 1941; 10. 1941; id. in Fl. Siam. En. 3: 96. 1951.——*E. noei* Kerr in Kew Bull. 1941; 11. 1941; id. in Fl. Siam. En. 3: 97. 1951.——*E. rabillii* Kerr in Kew Bull. 1941; 12. 1941; id. in Fl. Siam. En. 3: 97. 1951.——*E. poilanei* Gagn. in Not. Syst. 14: 28. 1950.

木质藤本,幼枝稍被柔毛,老枝有明显的纵长木栓棱。叶厚革质,椭圆形至长圆状椭圆形,长9—15厘米,宽4.5—7.5厘米,顶端骤然短渐尖,基部宽楔形,两面无毛,背面色较淡,侧脉约6对,纤细,与中脉在叶面明显下陷,在背面稍突起,网脉在叶面稍下陷,在背面明显下陷;叶柄长2—2.5厘米。花序腋生和顶生,总状或狭圆锥状,有时2—3枝同生叶腋,长(1.5—)3—8(—11)厘米,被锈色短的2叉状柔毛;花梗长2—4毫米;小苞片长圆形,早落;萼片近圆形,长3—4毫米,密被2叉状短柔毛;花冠白色,长约1.3厘米,小裂片长圆形,长约3.5—5毫米,有脉,边缘稍啮蚀状;雄蕊长约3毫米,花药披针形,长约1毫米,顶端锐尖至渐尖,基部心形;子房长1.3—1.6毫米,柱头圆锥状,具5条明显的脊。浆果椭圆形,长2厘米,黑褐色。花期8—10月,果期1—4月。

产广东海南,生于低山路旁、溪畔或海边的疏林中,通常攀援于大树上。分布中南半岛,模式标本采自海南。

本种茎、叶服用会引起重泻,不可代丁公藤用。

8. 丁公藤(南史) 麻辣仔藤(广东沿海)、斑鱼烈(广东) 图版4: 5—6

Erycibe obtusifolia Benth. Fl. Hongk. 236. 1861; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 156. 1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. add. ser. 10: 178. 1912; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 11: 55. 1932; Hand.-Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. 56: 451. 1937; Masamune, Fl. Kainant. 272. 1943; How in Sunyatsenia 6; 225. 1946; Hoogl. in Blumea 7(2): 352. 1953, p. p.; 海南植物志 3: 477. 1974, p. p.

高大木质藤本,长约12米;小枝干后黄褐色,明显有棱,不被毛。叶革质,椭圆形或倒长卵形,长6.5—9厘米,宽2.5—4厘米,顶端钝或钝圆,基部渐狭成楔形,两面无毛,侧脉4—5对,在叶面不明显,在背面微突起,至边缘以内网结上举;叶柄长0.8—1.2厘米,无毛。聚伞花序腋生和顶生,腋生的花少至多数,顶生的排列成总状,长度均不超过叶长的一半,花序轴、花序梗被淡褐色柔毛;花梗长4—6毫米;花萼球形,萼片近圆形,长3毫米,外面被淡褐色柔毛和有缘毛,毛不分叉;花冠白色,长1厘米,小裂片长圆形,全缘或浅波状,无齿;雄蕊不等长,花丝长可至1.5毫米,花药与花丝近等长,顶端渐尖,花丝之间有

鳞片;子房圆柱形,柱头圆锥状贴着子房,两者近相等长。浆果卵状椭圆形,长约 1.4 厘米。

产广东中部及沿海岛屿。生于山谷湿润密林中或路旁灌丛。

广东用茎切片做风湿病药酒(冯了性药酒)的原料,云治风湿有特效。

Hoogl. (1953) 将产于广东海南原被侯宽昭 (1946) 定名为 *E. laevigata* 的(应是 *E. schmidtii* Craib) 一类植物,认为也应该是 *E. obtusifolia* Benth., 实则两者的叶片和果实形态明显可以区别,不能认为是同一种。

9. 光叶丁公藤 丁公藤(海南植物志) 图版 4: 1—4

Erycibe schmidtii Craib in Bot. Tidsskr. 32: 352. 1916; Kerr in Fl. Siam. En. 3: 98. 1951; Hoogl. in Blumea 7(2): 355. 1953; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 100. 1965, p. p. maj.—*E. laevigata* auct. non Wall. ex Choisy; C. B. Clarke in Hook. f. Brit. Ind. 4: 181. 1883; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 446. 1911; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gen. Indo-Chine 4: 306. 1915; How in Sunyatsenia 6: 228. 1946.—*E. semipilosa* Gagn. in Not. Syst. 14: 28. 1950.—*E. obtusifolia* auct. non Benth.; Hoogl. in Blumea 7(2): 352. 1953, p. p.; 海南植物志 3: 477. 1974, p. p.

高大攀援灌木,小枝圆柱形,灰褐色,有细棱,无毛或贴生微柔毛。叶革质,卵状椭圆形或长圆状椭圆形,长 7—12 厘米,宽 2.5—6 厘米,顶端骤然渐尖,基部宽楔形或稍钝圆,两面无毛,中脉在叶面下陷侧脉 5—6 对,在叶面不明显,至边缘网结,网脉在背面稍微突起;叶柄长 1—2(—3.5) 厘米,幼时被微柔毛,老时无毛。聚伞花序成圆锥状,腋生和顶生,比叶短很多,长 2—7 厘米,密被锈色短柔毛,间有 2 叉状毛;花梗长 2—5 毫米,萼片近圆形,长约 3 毫米,外面稍密被锈色短柔毛,内萼片毛较密,被缘毛;花冠白色,芳香,长约 8 毫米,深 5 裂,瓣中带密被黄褐色绢毛,小裂片长圆形,边缘啮蚀状;花丝长约 1 毫米,基部扩大,花药长 1.8—2 毫米,圆锥状,顶端长渐尖,基部心形;雌蕊长约 2 毫米,子房圆柱形;柱头冠状,边缘有小裂片。浆果球形,干后黑褐色,直径约 1.5 厘米。

产云南东南部、广西西南至东部、广东。海拔 250—1200 米的山谷密林或疏林中,攀生于乔木上。

药用功效同丁公藤。

10. 瑶山丁公藤 图版 5: 5—8

Erycibe sinii How in Sunyatsenia 6: 226. 1946; Hoogl. in Blumea 7(2): 358. 1953.

攀援灌木;一年生枝条圆柱形,明显有条纹,灰褐色,无毛,当年生枝条压干后黑褐色,贴生疏柔毛。叶纸质,椭圆形或长圆状椭圆形,长 6—9 厘米,宽 2.5—4.3 厘米,顶端骤尖,基部楔形,不等,叶面无毛,下面略被小粗伏毛及小斑点,近于苍白色,中脉在叶面



图版 4:1—4. 光叶丁公藤 *Erycibe Schmidtii* Craib, 1. 花枝, 2. 花外形, 3. 果, 4. 花冠毛被; 5—6. 丁公藤 *E. obtusifolia* Benth., 5. 果枝, 6. 花外形。(肖溶绘)