

鳞片;子房圆柱形,柱头圆锥状贴着子房,两者近相等长。浆果卵状椭圆形,长约 1.4 厘米。

产广东中部及沿海岛屿。生于山谷湿润密林中或路旁灌丛。

广东用茎切片做风湿病药酒(冯了性药酒)的原料,云治风湿有特效。

Hoogl. (1953) 将产于广东海南原被侯宽昭 (1946) 定名为 *E. laevigata* 的(应是 *E. schmidtii* Craib) 一类植物,认为也应该是 *E. obtusifolia* Benth., 实则两者的叶片和果实形态明显可以区别,不能认为是同一种。

9. 光叶丁公藤 丁公藤(海南植物志) 图版 4: 1—4

Erycibe schmidtii Craib in Bot. Tidsskr. 32: 352. 1916; Kerr in Fl. Siam. En. 3: 98. 1951; Hoogl. in Blumea 7(2): 355. 1953; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 100. 1965, p. p. maj.—*E. laevigata* auct. non Wall. ex Choisy; C. B. Clarke in Hook. f. Brit. Ind. 4: 181. 1883; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 446. 1911; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gen. Indo-Chine 4: 306. 1915; How in Sunyatsenia 6: 228. 1946.—*E. semipilosa* Gagn. in Not. Syst. 14: 28. 1950.—*E. obtusifolia* auct. non Benth.; Hoogl. in Blumea 7(2): 352. 1953, p. p.; 海南植物志 3: 477. 1974, p. p.

高大攀援灌木,小枝圆柱形,灰褐色,有细棱,无毛或贴生微柔毛。叶革质,卵状椭圆形或长圆状椭圆形,长 7—12 厘米,宽 2.5—6 厘米,顶端骤然渐尖,基部宽楔形或稍钝圆,两面无毛,中脉在叶面下陷侧脉 5—6 对,在叶面不明显,至边缘网结,网脉在背面稍微突起;叶柄长 1—2(—3.5) 厘米,幼时被微柔毛,老时无毛。聚伞花序成圆锥状,腋生和顶生,比叶短很多,长 2—7 厘米,密被锈色短柔毛,间有 2 叉状毛;花梗长 2—5 毫米,萼片近圆形,长约 3 毫米,外面稍密被锈色短柔毛,内萼片毛较密,被缘毛;花冠白色,芳香,长约 8 毫米,深 5 裂,瓣中带密被黄褐色绢毛,小裂片长圆形,边缘啮蚀状;花丝长约 1 毫米,基部扩大,花药长 1.8—2 毫米,圆锥状,顶端长渐尖,基部心形;雌蕊长约 2 毫米,子房圆柱形;柱头冠状,边缘有小裂片。浆果球形,干后黑褐色,直径约 1.5 厘米。

产云南东南部、广西西南至东部、广东。海拔 250—1200 米的山谷密林或疏林中,攀生于乔木上。

药用功效同丁公藤。

10. 瑶山丁公藤 图版 5: 5—8

Erycibe sinii How in Sunyatsenia 6: 226. 1946; Hoogl. in Blumea 7(2): 358. 1953.

攀援灌木;一年生枝条圆柱形,明显有条纹,灰褐色,无毛,当年生枝条压干后黑褐色,贴生疏柔毛。叶纸质,椭圆形或长圆状椭圆形,长 6—9 厘米,宽 2.5—4.3 厘米,顶端骤尖,基部楔形,不等,叶面无毛,下面略被小粗伏毛及小斑点,近于苍白色,中脉在叶面



图版 4:1—4. 光叶丁公藤 *Erycibe Schmidtii* Craib, 1. 花枝, 2. 花外形, 3. 果, 4. 花冠毛被; 5—6. 丁公藤 *E. obtusifolia* Benth., 5. 果枝, 6. 花外形。(肖溶绘)