

鳞片;子房圆柱形,柱头圆锥状贴着子房,两者近相等长。浆果卵状椭圆形,长约 1.4 厘米。

产广东中部及沿海岛屿。生于山谷湿润密林中或路旁灌丛。

广东用茎切片做风湿病药酒(冯了性药酒)的原料,云治风湿有特效。

Hoogl. (1953) 将产于广东海南原被侯宽昭 (1946) 定名为 *E. laevigata* 的(应是 *E. schmidtii* Craib) 一类植物,认为也应该是 *E. obtusifolia* Benth., 实则两者的叶片和果实形态明显可以区别,不能认为是同一种。

9. 光叶丁公藤 丁公藤(海南植物志) 图版 4: 1—4

Erycibe schmidtii Craib in Bot. Tidsskr. 32: 352. 1916; Kerr in Fl. Siam. En. 3: 98. 1951; Hoogl. in Blumea 7(2): 355. 1953; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 100. 1965, p. p. maj.—*E. laevigata* auct. non Wall. ex Choisy; C. B. Clarke in Hook. f. Brit. Ind. 4: 181. 1883; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 446. 1911; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gen. Indo-Chine 4: 306. 1915; How in Sunyatsenia 6: 228. 1946.—*E. semipilosa* Gagn. in Not. Syst. 14: 28. 1950.—*E. obtusifolia* auct. non Benth.; Hoogl. in Blumea 7(2): 352. 1953, p. p.; 海南植物志 3: 477. 1974, p. p.

高大攀援灌木,小枝圆柱形,灰褐色,有细棱,无毛或贴生微柔毛。叶革质,卵状椭圆形或长圆状椭圆形,长 7—12 厘米,宽 2.5—6 厘米,顶端骤然渐尖,基部宽楔形或稍钝圆,两面无毛,中脉在叶面下陷侧脉 5—6 对,在叶面不明显,至边缘网结,网脉在背面稍微突起;叶柄长 1—2(—3.5) 厘米,幼时被微柔毛,老时无毛。聚伞花序成圆锥状,腋生和顶生,比叶短很多,长 2—7 厘米,密被锈色短柔毛,间有 2 叉状毛;花梗长 2—5 毫米,萼片近圆形,长约 3 毫米,外面稍密被锈色短柔毛,内萼片毛较密,被缘毛;花冠白色,芳香,长约 8 毫米,深 5 裂,瓣中带密被黄褐色绢毛,小裂片长圆形,边缘啮蚀状;花丝长约 1 毫米,基部扩大,花药长 1.8—2 毫米,圆锥状,顶端长渐尖,基部心形;雌蕊长约 2 毫米,子房圆柱形;柱头冠状,边缘有小裂片。浆果球形,干后黑褐色,直径约 1.5 厘米。


产云南东南部、广西西南至东部、广东。海拔 250—1200 米的山谷密林或疏林中,攀生于乔木上。

药用功效同丁公藤。

10. 瑶山丁公藤 图版 5: 5—8

Erycibe sinii How in Sunyatsenia 6: 226. 1946; Hoogl. in Blumea 7(2): 358. 1953.

攀援灌木;一年生枝条圆柱形,明显有条纹,灰褐色,无毛,当年生枝条压干后黑褐色,贴生疏柔毛。叶纸质,椭圆形或长圆状椭圆形,长 6—9 厘米,宽 2.5—4.3 厘米,顶端骤尖,基部楔形,不等,叶面无毛,下面略被小粗伏毛及小斑点,近于苍白色,中脉在叶面



图版 5:1—4. 多花丁公藤 *Erycibe myriantha* Merr. 1.花外形,2.花冠展开,3.子房,4.雄蕊; 5—8.玉山丁公藤 *E. sinii* How, 5.花枝, 6.花冠1部分, 7.子房, 8.雄蕊; 9—12. 台湾丁公藤 *E. henryi* Prain, 9.花枝,10.花冠一部分,11.子房,12.雄蕊。(肖溶绘)

凹陷,背面突起,侧脉 5—7 对,弧曲上升,沿边缘汇合,在叶面不明显,在背面稍突起,网脉几乎不显著;叶柄细。花序顶生和腋生,为简单的总状或圆锥状,密被贴伏的黄色短柔毛,顶生者延伸成狭圆锥状花序,长 8—10 厘米,多花,腋生总状花序简单,长 2—3 厘米,少花;花梗长 2 毫米;小苞片线状披针形,锐尖;萼片圆,宽 2—3 毫米,密被贴生的褐色绢毛;花冠长约 7.5 毫米,小裂片长圆状卵形,长约 3 毫米,具脉,边缘具细圆齿;花药卵状长圆形,顶端骤然渐尖,收缩成 1 毫米长,花丝短,基部扩大;子房球形,柱头头状,具 5 沟槽。果实未见。花期 6 月。

产广西。模式标本采自广西大瑶山。

11. 台湾丁公藤 图版 5: 9—12

Erycibe henryi Prain in Journ. Asiat. Soc. Beng. 73(2): 15. 1904; Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 446. 1911; Sasaki, Cat. Gov. Herb. Formos. 424. 1930; How in Sunyatsenia 6: 225. 1946; Hoogl. in Blumea 7(2): 350. 1953; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 809. f. 326. 1963.——*E. obtusifolia* auct. non Benth. Hayata, Icon. Pl. Formos. 2: 122. 1912.——*E. acutifolia* Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 76. 1920; Yamamoto, Suppl. Icon. Pl. Formos. 1: 44. 1925; Sasaki, Cat. Gov. Herb. Formos. 424. 1930.

攀援灌木;小枝细,褐灰色,无毛,圆柱形。叶纸质,卵形或圆卵形,长 5—7 厘米,宽 3—4.5 厘米,先端骤尖,基部楔形,两面无毛,干时叶片绉缩不平,中脉在叶面凹陷,背面突出,侧脉 5 对,与网脉在两面突起;叶柄长 1.5 厘米,纤细,有微柔毛。圆锥花序腋生和顶生,顶生的长 8—9 厘米,腋生的长 2—7 厘米,贴生短柔毛,有时花少至 3—5 朵;萼片长圆形,长 2 毫米,被短柔毛和有缘毛;花冠白色,长约 8 毫米,裂片长椭圆形或长圆形,边缘钝波状或全缘,瓣中带贴生锈色毛,毛不分叉;雄蕊长 2 毫米,花丝和花药近等长,花药卵形,顶端渐尖或尾状尖;子房圆柱形,长 1 毫米,柱头头状,比子房稍宽,有明显的 5 条棱脊,棱脊间又有小的突起,所以具不规则的 10 槽。果未见。

产我国台湾。生于海拔 200 米以下的林内。分布日本(琉球群岛)。

5. 飞蛾藤属 *Porana* Burm. f.

Burm. f. Fl. Ind. 51. t. 21. f. 1. 1768.

藤本,木质或草质,或攀援灌木。叶具柄,卵形,大多基部心形,掌状脉,稀羽状,全缘,稀分裂,草质。总状或圆锥花序,稀单花。苞片叶状,或小而钻状,或缺。萼片 5, 相等或不相等,在果时 3 个外萼片或全部极增大,干膜质,具网状脉,开展,通常匙形或长圆形,与果一起脱落。花冠整齐,白色,淡红色,稀淡紫色,小或中等大,钟形或漏斗形,稀较大且漏斗状或高脚碟状,冠檐近全缘或 5 裂;雄蕊及花柱内藏,稀伸出;雄蕊 5, 花丝丝状,着生于