

1室, 4胚珠, 花柱单1, 丝状, 长7毫米, 向基部被污黄色疏柔毛, 柱头圆球头状, 2裂。果未见。

产四川西北部。生于海拔1100米的溪边。模式标本采自金川。

极近大果飞蛾藤 *Porana sinensis* hemsl., 但花较小 (长约1.2厘米), 叶较密集, 上面疏被污黄色伏疏柔毛, 下面沿中脉侧脉及细脉疏生小疏柔毛为异。

## 6. 美飞蛾藤

*Porana spectabilis* Kurz in Journ. Bot. 11: 36. 1873, et For. Fl. Burma 2: 221. 1877; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 221. 1883; Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 3: 359. 1916; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 293. f. 32. 1915; Kerr in Craib Fl. Siam. Enum. 3(1): 92. 1951; v. Ooststr. in Fl. Males. ser. 1, 4(4): 404. 1953; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 101. 1965.——*P. speciosa* Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 876. 1876, sphalm.

### 6a. 美飞蛾藤(原变种)

*Porana spectabilis* Kurz var. *spectabilis*

木质藤本, 幼枝圆柱形, 被黄褐色绒毛, 老枝褐色, 具纵向皱纹, 被较疏的短柔毛。叶卵状长圆形, 长10—12厘米, 宽4.5—5(—7)厘米, 先端锐尖或稍钝, 基部圆形或浅心形, 叶面被短柔毛, 背面极密被淡黄褐色柔毛至绒毛; 叶脉基出, 掌状, 叶面凹陷, 背面突起, 侧脉1—2对; 叶柄长1.5—2.5厘米, 密被黄褐色短柔毛。总状花序稀疏, 由3花沿花序梗间断簇生组成, 腋生或顶生; 花梗长5—7毫米; 总梗及花梗均密被黄褐色绒毛; 萼片线状长圆形, 不等长, 较大的3个外萼片长约5毫米, 两面被黄褐色绒毛, 2个较小的内萼片狭而短; 在果时3个外萼片极增大, 长3.5—4厘米, 长圆形, 钝, 被短柔毛, 基部具5脉; 花冠宽漏斗状, 长2.5—3.5厘米, 白色, 张开时直径达3—4厘米, 外面被绒毛, 内面仅于管下部着生雄蕊的部分被疏长柔毛, 管长12—15毫米; 冠檐近全缘或浅裂; 雄蕊5, 着生于冠管中下部, 花丝近等长, 丝状, 长约9毫米, 花药箭形, 长约2毫米; 子房圆锥状, 无毛, 花柱长约15毫米, 下半部被长丝毛, 柱头近头状, 蒴果近球形, 直径约0.5厘米。

广东、广西及云南有分布, 生于海拔620—800米的沟谷或山坡。分布于印度(东北部、安达曼岛), 缅甸(毛淡棉), 越南, 老挝及马来半岛。模式标本采自缅甸。

本种与大果飞蛾藤 *Porana sinensis* hemsl. 相近, 但花几大1倍, 白色, 外被绒毛, 花冠长2.5—3.5厘米, 张开时直径达3—4厘米, 萼片在果时3个增大, 长达4厘米。枝和叶两面被污黄褐色绒毛。叶常卵状长圆形, 基部圆形, 稀浅心形而易区别。

### 6b. 大花飞蛾藤(变种)

*Porana spectabilis* Kurz var. *megalantha* (Merr.) How, 海南植物志 3: 475. 图 867. 1974.——*P. megalantha* Merr. in Lingnan Sci. Journ. 14: 53. f.