

18. 1935.

与原变种不同仅在于花冠较大,长4.5—5厘米,直径4.5厘米。

产广东海南(崖县、白沙、乐东)及广西,生于山地疏林或灌丛中。模式标本产海南崖县(花模式)及广西响水(果模式)。

亚属2. 假棒柱亚属 Subg. *Pseudodinetus* Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 3: 359. 1916.

子房具2胚珠;柱头卵状球形,雄蕊花丝不等长,着生于花冠管基部同1高度。花盘显著。

7. 蒙自飞蛾藤 图版6: 4—5

Porana dinetoides Schneid. in Sarg. Pl. Wils. 3: 360. 1916.

7a. 蒙自飞蛾藤

Porana dinetoides Schneid. var. *dinetoides*

攀援灌木,幼枝黄褐色,圆柱形,具棱,扭曲,被黄色硬毛至短柔毛。叶深心脏卵形至心脏圆形,长7—10厘米,宽4.5—9厘米,先端骤尾状尖,基部心形,叶面疏被背面密被黄色硬毛至短柔毛,全缘,具缘毛;叶柄长3—6厘米;花序的苞叶长2.5—5.5厘米,宽1.2—4厘米,柄长0.3—1.5厘米,被黄色硬毛。圆锥花序,腋生,或多或少较叶长,花梗长4—7毫米,被黄色短硬毛或无毛;苞片披针形,被硬毛;小苞片微小;萼片近等长,狭披针形,无毛或疏被黄色短硬毛,长约2毫米;花冠钟状,长7—8毫米,白色,张开宽约7毫米;外面无毛,仅在裂片先端具1束短硬毛,内面在基部着生雄蕊处具疏长柔毛;雄蕊5,内藏,着生于冠管基部同1水平面,花丝不等长,最短的与长圆形的花药近等长,其余的为1.5—2倍长;花盘显著;子房无柄,1室,2胚珠,花柱单1,稍长过卵状球形的单柱头。果时宿存萼片干膜质,3个极增大,宽长圆形,长约1厘米,宽4毫米,具小短尖,2个稍短而狭,全部具纵贯的5脉,无毛。果椭圆状长圆形,长约7毫米,宽约4毫米,冠以花柱基部,无毛,黄褐色。种子1,倒卵状圆形,侧扁,长约6毫米,红褐色。

产云南东南部及西北部(蒙自、文山、马关、广南、兰坪)。生于海拔1200—2400米的草坡或灌丛中。模式标本采自蒙自。

7b. 冕宁飞蛾藤

Porana dinetoides Schneid. var. *mienningsensis* S. H. Huang, var. nov.
in Addenda 163.

与原变种不同在于,枝条和叶极疏被微柔毛或近无毛,花序较大,雄蕊近伸出。

产四川西部(冕宁),生于海拔1420米的山谷。模式标本采自冕宁金矿。

8. 锥序飞蛾藤

Porana megathyrsa C. Y. Wu, 吴征镒、李锡文,云南热带亚热带植物区系研究报告1: 101. 图版18. 1965.



图版 6 : 1—3. 圆锥飞蛾藤 *Porana paniculata* Roxb., 1. 花枝, 2. 花冠展开, 3. 雌蕊; 4—5. 蒙自飞蛾藤 *P. dinetoides* Schneid., 4. 花冠展开, 5. 雌蕊。(李锡畴绘)