

疏被背面密被丝状长柔毛,掌状脉基出,5条,侧脉2—3;叶柄长4—7厘米,具棱和槽,密被丝状长柔毛。总状花序腋生,长约11厘米,有花10—14朵,总花梗长3.5—5.5厘米,密被淡黄褐色丝状长柔毛,花梗长5—9毫米;苞片卵状披针形,长约3毫米,均密被淡黄褐色丝状长柔毛;小苞片微小,位于花梗顶端紧贴花萼,钻形,密被淡黄褐色丝状长柔毛;萼片卵状披针形,近等长,长约4.5毫米,渐尖,外面密被淡黄褐色丝状长柔毛,内面2个稍狭;花冠漏斗状,长约3.7厘米,淡紫红色,下部冠筒长约1.3厘米,直径约2毫米,上部骤然开展的冠檐长2.4厘米,径约3厘米,外面无毛,冠檐浅5裂,裂片卵状三角形;雄蕊5,着生于花冠筒内距基部3.5毫米同一水平面稍膨大处,筒内基部微被长柔毛,花丝丝状,短,长约1毫米,无毛,花药长圆形,长约2.5毫米,先端钝;子房圆锥状,长约1毫米,无毛,1室,2胚珠;花柱丝状,长2.2毫米,柱头近球状,长稍大于宽,长约0.5毫米。蒴果近球形,果萼中3个极增大,具7—9脉,2个较小,长约2.2—2.5厘米。

产我国西藏南部(聂拉木县樟木),生海拔2400米的山谷林缘。分布尼泊尔,锡金。

## 6. 心萼薯属 *Aniseia* Choisy

Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 481. 1833.

平卧或缠绕草本,无毛以至具绒毛。叶具柄,线形、披针形、卵形、心形或箭形,通常具小短尖。花序腋生,由1至少花组成聚伞花序;萼片5,不等,外面的2(—3)片较大,基部心形或耳形,通常下延于花梗,于花期或多或少增大;花冠小或显著,辐射对称,宽管状、钟状或漏斗状,外面具5条界线明显的被毛的瓣中带,冠檐5浅裂或近全缘;雄蕊5,内藏,花丝丝状,贴生于花冠管上;花粉粒无刺;花盘小或不存;子房无毛,2室,每室具2胚珠;花柱单一,内藏,柱头2裂,裂片球形或长圆形。蒴果卵形或球形,无毛,4瓣裂。种子4或较少,三棱形或球形,黑色,通常被毛。

本属约8种,5种限于美洲的热带及亚热带,其他3种亦见于东半球,印度及热带非洲1种,我国南部、西南部至越南2种。

## 分种检索表

1. 花较大,萼片长2—2.2厘米,基部有流苏状齿;叶片三角状卵形,基部箭形,两面无毛……………2. 狭花心萼薯 *A. stenantha* (Dunn) Ling
1. 花较小,萼片长0.8—1厘米,基部耳形无流苏状齿;叶片心形或三角状心形,两面被疏长柔毛……………1. 心萼薯 *A. biflora* (Linn.) Choisy
1. 心萼薯(区系报告) 满山香、黑面藤、亚灯堂、华陀花、籐番薯、老虎豆(广西),毛牵牛(广州植物志) 云南热带亚热带植物区系研究报告 图版10: 3

*Aniseia biflora* (Linn.) Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 483. 1833; id. in DC. Prodr. 9: 431. 1845; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告