

1: 107. 1965; 中国高等植物图鉴 3: 530. 图 5013. 1974.——*Convolvulus biflorus* Linn. Sp. Pl. ed. 2. 1668. 1763, non Forsk. 1775.——*C. sinensis* Desr. in Lam. Encycl. 3(2): 557. 1791—92.——*Ipomoea biflora* (Linn.) Pers. Syn. Pl. 1: 183. 1805; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 157. 1890, non R. Br. 1810.——*I. sinensis* (Desr.) Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 469. 1833, et in DC. Prodr. 9: 370. 1845; Benth. Fl. Hongk. 239. 1861; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 162. 1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. add. ser. 10: 180. 1912; Chun in Sunyatsenia 1 (2—3): 186. 1933; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 243. f. 29. 4. 1915; 侯宽昭等, 广州植物志 588. 1956, non Fish. 1812.——*I. hardwickii* Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 160. 1890, non est *Convolvulus hardwickii* Spreng. 1827.

攀援或缠绕草本; 茎细长, 径约 1.5—4 毫米, 有细棱, 被灰白色倒向硬毛。叶心形或心状三角形, 长 4—9.5 厘米, 宽 3—7 厘米, 顶端渐尖, 基部心形, 全缘或很少为不明显的 3 裂, 两面被长硬毛, 侧脉 6—7 对, 在两面稍突起, 第三次脉近于平行, 细弱, 叶柄长 1.5—8 厘米, 毛被同茎。花序腋生, 短于叶柄, 花序梗长 3—15 毫米, 或有时更短则花梗近于簇生, 毛被同叶柄, 通常着生 2 朵花, 有时 1 或 3; 苞片小, 线状披针形, 被疏长硬毛; 花梗纤细, 长 8—15 毫米, 毛被同叶柄; 萼片 5, 外萼片三角状披针形, 长 8—10 毫米, 宽 4—5 毫米, 基部耳形, 外面被灰白色疏长硬毛, 具缘毛, 内面近于无毛, 在内的 2 萼片线状披针形, 与外萼片近等长或稍长, 萼片于结果时稍增大; 花冠白色, 狭钟状, 长 1.2—1.5 (—1.9) 厘米, 冠檐浅裂, 裂片圆; 瓣中带被短柔毛; 雄蕊 5, 内藏, 长 3 毫米, 花丝向基部渐扩大, 花药卵状三角形, 基部箭形; 子房圆锥状, 无毛, 花柱棒状, 长 3 毫米, 柱头头状, 2 浅裂。蒴果近球形, 径约 9 毫米, 果瓣内面光亮。种子 4, 卵状三棱形, 高 4 毫米, 毛被不尽相同, 被微毛或被短绒毛, 沿两边有时被白色长绵毛。

产我国台湾、福建、江西、湖南、广东及其沿海岛屿、广西、贵州、云南等省区。生于海拔 150—1800 米的山坡、山谷、路旁或林下, 常见于较干燥处。越南也有。

广西民间用茎、叶治小儿疳积, 种子治跌打、蛇伤。

2. 狭花心萼薯

Aniseia stenantha (Dunn) Ling in herb.——*Ipomoea stenantha* Dunn in Kew Bull. add. ser. 10: 180. 1912.

缠绕草本; 茎细长, 径约 1—1.5 毫米, 有不明显的细棱, 近节处疏被微硬毛, 节间毛较少或因脱落而无毛。叶三角状卵形, 长 5—8 厘米, 宽 3—5 厘米, 顶端渐尖, 先端微凹, 有小短尖头, 基部箭形, 两面无毛, 侧脉 5—6 对, 在两面均不明显; 叶柄长 2—5 厘米, 无毛。花 1—2 朵生于叶腋, 花梗长 1.5—3.5 厘米, 疏被开展的微硬毛, 在中部或中部以上着生 1 对卵形的苞片, 长 8—11 毫米, 顶端芒尖, 无毛; 萼片卵状披针形, 长 2—2.2 厘米,

内萼片较短,顶端渐尖成芒状,有3条脉,在外面隆起成狭翅,至萼片基部翅略变宽,具边缘有流苏状的齿,无毛;花冠红色,漏斗状,长约2.5厘米,冠檐裂片三角形,略开展;雄蕊内藏,着生花冠管基部;子房圆锥状,2室,4胚珠,花柱内藏,长约5毫米,柱头头状,2浅裂。蒴果圆锥状,高1—1.3厘米。种子黑褐色,卵状球形,高约5毫米,表面密被短茸毛。

产广东、福建(建阳、漳平、长汀)。模式标本采自广东海丰莲花山。

7. 猪菜藤属 *Hewittia* Wight et Arnott

Wight et Arnott in Madras Journ. Lit. Sci. 1(5): 22. 1837.——

Shutereia Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 485. 1833, non

Shuteria Wight et Arnott 1834, nom. cons. Legum.

缠绕或平卧草本,全体被短柔毛。叶心形,全缘或稍裂,具叶柄。花序腋生,为1至少花的聚伞花序;苞片2,长圆形或线状披针形,渐尖;萼片5,革质,通常具短尖,外面的3片大,卵形,果时膨大,内面的2片很小;花冠辐射对称,钟状至漏斗状,冠檐具折,浅5裂;雄蕊内藏,花丝基部扩大,稍嵌入花冠折内,花药短,长圆形;花粉粒无刺;花盘环状;子房被毛,1室或上部不完全的2室,胚珠4;花柱单一,丝状,柱头2裂,裂片卵状长圆形。蒴果球形,4瓣裂,种子4或较少,暗黑色,平滑。

单种属,分布于东半球热带(自热带非洲至马来亚及波利尼西亚)。

1. 猪菜藤(海南植物志) 细样猪菜藤、野薯藤(广东,海南及其他沿海岛屿)。图版10: 1—2

Hewittia sublobata (Linn. f.) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 441. 1891; Groff, Ding et Groff in Lingnan Agr. Rev. 2: 1132. 1924; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 154. 1927; v. Ooststr. in Fl. Males. ser. 1, 4(4): 438. f. 22. 1953; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 108. 1965; 海南植物志 3: 479. 图 870. 1974; 中国高等植物图鉴 3: 529. 图 5012. 1974.——*Convolvulus sublobatus* Linn. f. Suppl. 135. 1781.——*C. bracteatus* Vahl, Symb. Bot. 3: 25. 1794.——*C. bicolor* Vahl, l. c. 25——*Shutereia bicolor* (Vahl) Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 485. f. 2. f. 11. 1833; id. in DC. Prodr. 9: 435. 1845.——*Hewittia bicolor* (Vahl) Wight in Madras Journ. Lit. Sci. 1(5): 22. 1837; id. Icon. Pl. Ind. Or. 3(2): t. 835. 1844—45 (“Heivetia”); C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 216. 1883; Hance in Journ. Bot. Brit. et For. 16: 231. 1878; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 163. 1890; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gén. Inco-Chine 4: 298. f. 34. 1915; Chun in Sunyatsenia 1: 187. 1933.——*Shutereia sublobata* (Linn. f.) House in Bull. Torr. Club 33: 318. 1906;