

内萼片较短,顶端渐尖成芒状,有3条脉,在外面隆起成狭翅,至萼片基部翅略变宽,具边缘有流苏状的齿,无毛;花冠红色,漏斗状,长约2.5厘米,冠檐裂片三角形,略开展;雄蕊内藏,着生花冠管基部;子房圆锥状,2室,4胚珠,花柱内藏,长约5毫米,柱头头状,2浅裂。蒴果圆锥状,高1—1.3厘米。种子黑褐色,卵状球形,高约5毫米,表面密被短茸毛。

产广东、福建(建阳、漳平、长汀)。模式标本采自广东海丰莲花山。

7. 猪菜藤属 *Hewittia* Wight et Arnott

Wight et Arnott in Madras Journ. Lit. Sci. 1(5): 22. 1837.——

Shutereia Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 485. 1833, non

Shuteria Wight et Arnott 1834, nom. cons. Legum.

缠绕或平卧草本,全体被短柔毛。叶心形,全缘或稍裂,具叶柄。花序腋生,为1至少花的聚伞花序;苞片2,长圆形或线状披针形,渐尖;萼片5,革质,通常具短尖,外面的3片大,卵形,果时膨大,内面的2片很小;花冠辐射对称,钟状至漏斗状,冠檐具折,浅5裂;雄蕊内藏,花丝基部扩大,稍嵌入花冠折内,花药短,长圆形;花粉粒无刺;花盘环状;子房被毛,1室或上部不完全的2室,胚珠4;花柱单一,丝状,柱头2裂,裂片卵状长圆形。蒴果球形,4瓣裂,种子4或较少,暗黑色,平滑。

单种属,分布于东半球热带(自热带非洲至马来亚及波利尼西亚)。

1. 猪菜藤(海南植物志) 细样猪菜藤、野薯藤(广东,海南及其他沿海岛屿)。图版10: 1—2

Hewittia sublobata (Linn. f.) O. Ktze. Rev. Gen. Pl. 441. 1891; Groff, Ding et Groff in Lingnan Agr. Rev. 2: 1132. 1924; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 5: 154. 1927; v. Ooststr. in Fl. Males. ser. 1, 4(4): 438. f. 22. 1953; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 108. 1965; 海南植物志 3: 479. 图 870. 1974; 中国高等植物图鉴 3: 529. 图 5012. 1974.——*Convolvulus sublobatus* Linn. f. Suppl. 135. 1781.——*C. bracteatus* Vahl, Symb. Bot. 3: 25. 1794.——*C. bicolor* Vahl, l. c. 25——*Shutereia bicolor* (Vahl) Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 485. f. 2. f. 11. 1833; id. in DC. Prodr. 9: 435. 1845.——*Hewittia bicolor* (Vahl) Wight in Madras Journ. Lit. Sci. 1(5): 22. 1837; id. Icon. Pl. Ind. Or. 3(2): t. 835. 1844—45 (“Heivetia”); C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 216. 1883; Hance in Journ. Bot. Brit. et For. 16: 231. 1878; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 163. 1890; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gén. Inco-Chine 4: 298. f. 34. 1915; Chun in Sunyatsenia 1: 187. 1933.——*Shutereia sublobata* (Linn. f.) House in Bull. Torr. Club 33: 318. 1906;