

v. Ooststr. in *Blumea* 3: 286. 1939.

缠绕或平卧草本；茎细长，径约 1.5—3 毫米，有细棱，被短柔毛，有时节上生根，叶卵形、心形或戟形，长 3—6（—10）厘米，宽 3—4.5（—8）厘米，顶端短尖或锐尖，基部心形、戟形或近截形，全缘或 3 裂，两面被伏疏柔毛或叶面毛较少，有时两面有黄色小腺点，侧脉 5—7 对，与中脉在叶面平坦，背面突起，网脉在叶面不显，背面微细，叶柄长 1—2.5 厘米，密被短柔毛。花序腋生，比叶柄长或短，花序梗长 1.5—5.5 厘米，密被短柔毛；通常 1 朵花；苞片披针形，长 7—8 毫米，被短柔毛；花梗短，长 2—4 毫米，密被短柔毛；萼片 5，不等大，在外 2 片宽卵形，长 9—10 毫米，宽 6—7 毫米，顶端锐尖，两面被短柔毛，结果时增大，长 1.9 厘米，内萼片较短且狭得多，长圆状披针形，被短柔毛，结果时长 1.4 厘米；花冠淡黄色或白色，喉部以下带紫色，钟状，长 2—2.5 厘米，外面有 5 条密被长柔毛的瓣中带，冠檐裂片三角形；雄蕊 5，内藏，长约 9 毫米，花丝基部稍扩大，具细锯齿状乳突，花药卵状三角形，基部箭形；子房被长柔毛，花柱丝状，柱头 2 裂，裂片卵状长圆形。蒴果近球形，为宿存萼片包被，具短尖，径约 8—10 毫米，被短柔毛或长柔毛。种子 2—4，卵圆状三棱形，无毛，高 4—6 毫米。

产我国台湾、广东（包括海南、西沙永兴岛等沿海岛屿）、广西西南部、云南南部。生于海拔 40—550 米的平地沙土或灌丛阳处。分布热带非洲（南至纳塔耳）、热带亚洲（印度、斯里兰卡、越南经马来亚、菲律宾至波利尼西亚）。

8. 小牵牛属 *Jacquemontia* Choisy

Choisy in *Mém. Soc. Phys. Genève* 6: 476. 1833.

缠绕或平卧，稀直立草本，或木质藤本，被柔毛，绒毛或无毛。叶具柄，大小和形状多变，通常心形，全缘，稀具齿或浅裂。花小，腋生，伞形或头状聚伞花序，或为苞片和苞叶包被的头状花序，或稀疏的总状花序，或密集顶生的穗状或头状花序，稀单生。苞片小，线形或披针形，或较大而叶状；萼片 5，等长或稍不等长，通常外面的较宽大；花冠整齐，中等大小或小，漏斗状或钟状，蓝色，淡紫色，粉红色，稀白色；具 5 条明显的瓣中带，冠檐 5 齿或近全缘，稀 5 浅裂；雄蕊及花柱内藏；雄蕊 5，花丝丝状，贴生于花冠基部；花药长椭圆形，花粉粒无刺；子房 2 室，每室 2 胚珠；花柱丝状，顶端 2 尖裂，柱头裂片大多椭圆形，或长圆形，或扁平，稀线形或球形。花盘小或无。蒴果球形，2 室，4 或最后 8 瓣裂。种子 4 或较少，平滑或具小乳突，无毛或被短绒毛，背部边缘通常具 1 狭的干膜质的翅。

约 120 种，主产美洲热带及亚热带，少数种类亦分布于东半球热带及亚热带。我国 1 种，产广东、广西、云南及台湾等省区。

1. 小牵牛（海南植物志） 假牵牛（中国高等植物图鉴） 图版 1: 5—6

Jacquemontia paniculata (Burm. f.) Hall. f. in *Engl. Bot. Jahrb.* 16: