

9. 打碗花属 *Calystegia* R. Br.

R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 483. 1810, nom. cons.——*Convolvulus* Sect. *Calystegia* Benth. Fl. Austr. 4: 428, 430. 1869.

多年生缠绕或平卧草本，通常无毛，有时被短柔毛。叶箭形或戟形，具圆形，有角或分裂的基裂片。花腋生，单一或稀为少花的聚伞花序；苞片2，叶状，卵形或椭圆形，包藏着花萼，宿存；萼片5，近相等，卵形至长圆形，锐尖或钝，草质，宿存；花冠钟状或漏斗状，白色或粉红色，外面具5条明显的瓣中带，冠檐不明显5裂或近全缘；雄蕊及花柱内藏；雄蕊5，贴生于花冠管，花丝近等长，基部扩大；花粉粒球形，平滑；花盘环状；子房1室或不完全的2室，4胚珠；花柱1，柱头2，长圆形或椭圆形，扁平。蒴果卵形或球形，1室，4瓣裂。种子4，光滑或具小疣。

约25种，分布于两半球的温带和亚热带。我国有5种，南北均产。

分 种 检 索 表

1. 苞片覆盖萼片；叶不为肾形。
 2. 植株通常不被毛。
 3. 苞片较小，长0.8—1.6厘米；宿萼及苞片与果近等长或稍短；植株通常矮小铺地……………1. 打碗花 *C. hederacea* Wall. ex Roxb.
 3. 苞片较大，长1.5—2.3厘米；宿萼及苞片增大包藏果实；茎缠绕，伸长……………2. 旋花 *C. sepium* (Linn.) R. Br.
 2. 植株被毛。
 4. 叶卵状长圆形、卵状三角形，或3裂，中裂片长圆形；叶柄长1—4(—5)厘米；植株淡黄色短柔毛……………3. 毛打碗花 *C. dahurica* (Herb.) Choisy
 4. 叶长圆形或线状长圆形，基部圆形、截形或微呈戟形；叶柄短，长0.2—1.5(—2)厘米；植株密被灰白色或黄褐色柔毛……………4. 藤长苗 *C. pellita* (Ledeb.) G. Don
1. 苞片比萼片短；叶肾形；平卧草本，多生于海滨沙滩……………5. 肾叶打碗花 *C. soldanella* (Linn.) R. Br.

1. 打碗花 燕覆子(图考)，蒲(铺)地参、盘肠参(滇南本草)，兔耳草、富苗秧、傅斯劳草、兔儿苗、扶七秧子、扶秧、走丝牡丹(江苏)，面根藤、钩耳藤、喇叭花、狗耳丸、狗耳苗(四川)，小旋花(江苏、陕西)，狗儿秧(陕西)，扶苗、扶子苗(山东)，旋花苦蔓(山西)，老母猪草(云南)

Calystegia hederacea Wall. Cat. n. 1328. 1828, nom. nud., ex Roxb. Fl. Ind. ed. Carey et Wall. 2: 94. 1824; Choisy in DC. Prodr. 9: 434. 1845; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 217. 1883; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 164. 1890; Liou et Ling, Fl. Ill. N. Chine 1: 25. t. 8. 1931;