

枚,卵圆形,光滑,具喙,淡褐色。

产我国内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、河北、河南、甘肃、宁夏、陕西、山西、新疆、青海及西藏东部。生干旱山坡草地或路旁。分布朝鲜,蒙古,苏联。

6. 线叶旋花 图版 13: 5—7


Convolvulus lineatus Linn. Syst. ed. 10. 923. 1759; id. Sp. Pl. 2: 224. 1762; Choisy in DC. Prodr. 9: 403. 1845; Ю. С. Григорьев in Fl. URSS 19: 26. 1953. — *C. spicaefolius* Desr. in Lam. Encycl. 3: 549. 1789.

多年生草本,具粗的根茎;茎多数,平卧或上升,长3—20(—40)厘米,分枝和叶均密被贴生银色至金黄色绢毛;叶椭圆形,长圆形至长圆状倒披针形,稀线状长圆形,长4—6厘米,宽(5—)6—25毫米,枝端的较狭,先端锐尖或短尖,基部渐狭(下延),下部的叶具长柄。花序少花(3—4朵),位于茎及侧枝顶,通常短于叶片,成不大的密集的聚伞花序,稀单一;萼片长6—10毫米,密被贴生银色绢毛,外萼片长圆形,或长圆状椭圆形,先端稍狭,向外反折,内萼片常更宽,渐尖;花冠漏斗形,长15—25毫米,亮玫红色或白色,外面于瓣中带上密被黄色绢毛;雄蕊5,稍不等长,花丝丝状,基部扩大,扁平,较花冠短一半,花药箭形;雌蕊稍长过雄蕊,子房被毛,花柱丝状,2裂,柱头2,线形;花盘环状。蒴果卵形,或多或少被贴生毛。花期6—8月。

产我国新疆,生于半荒漠草原及干草原地带或砾石滩中。欧洲南部、亚洲温带及苏联有分布。

7. 田旋花 中国旋花、箭叶旋花(中国高等植物图鉴),扶田秧、扶秧苗(江苏),白花藤、面根藤(四川),三齿草藤(甘肃),小旋花(四川、甘肃),燕子草(山东),田福花(新疆)

Convolvulus arvensis Linn. Sp. Pl. 153. 1753, et ibid. ed. 2: 218. 1762; Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 479. 1833, et in DC. Prodr. 9: 406. 1845; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 219. 1883; Lévl. Cat. Pl. Yunnan 58. 1915—16; Liou et Ling, Fl. Ill. N. Chine 1: 15. t. 3. 1931; v. Ooststr. in Blumea 3: 283. 1939, et in Fl. Males ser. 1, 4(4): 437. 1953; Ю. С. Григорьев in Fl. URSS 19: 29. 1953; 中国高等植物图鉴 3: 528. 图 5009. 1974. — *C. chinensis* Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 322. 1878; Kitagawa, Lineam. Fl. Manch. 366. 1939. — *C. arvensis* Linn. var. *sagittaeifolius* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 11: 797. 1838. — *C. arvensis* Linn. var. *crassifolius* Choisy in DC. Prodr. 9: 406. 1845. — *C. arvensis* Linn. var. *linearifolius* Choisy in DC. Prodr. 9: 407. 1845. — *C. arvensis* Linn. var. *angustatus* Ledeb. Pl. Alt. 1: 224. 1829. — *C. arvensis* Linn. var. *sagittatus* Ledeb. l. c. — *C. sagittifolius* (Fisch.) Liou et Ling, Fl. Ill. N. Chine 1: 17. t. 4. 1931.



图版 13:1—4. 直立旋花 *Convolvulus pseudocantabrica* Schrenk, 1. 植株一部分, 2—3. 内外萼片, 4. 茎; 5—7. 线叶旋花 *C. lineatus* Linn., 5. 植株, 6. 部分叶, 7. 茎; 8—12. 草坡旋花 *C. steppicola* Hand. -Mazz., 8. 花枝, 9. 花冠展开, 10. 雌蕊, 11. 内萼片, 12. 外萼片。(李锡畴绘)