

缘,顶端钝或锐尖,具小短尖头或微凹,基部截形、圆形、耳形以至戟形,两面被平伏的长硬毛,或有时背面毛较少;叶柄长0.5—2.5厘米。花序腋生,为单歧式(总状式或单侧式)或二歧式聚伞花序,后者第一次分枝为二歧式,第二次为单歧式,着生1至数朵花;花序梗长1.5—3.5厘米,下部被平展长柔毛,向上渐无毛;花梗长0.5—1厘米,无毛;苞片卵形,长1—2毫米,无毛,宿存;花蕾长圆形至椭圆形,钝;萼片椭圆形或椭圆状长圆形,钝,外方2片长3—5毫米,内方3片长约6毫米;花冠淡黄色或白色,宽漏斗形,长0.9—1.1(—1.8)厘米,无毛,瓣中带干时具明显的褐色脉纹;雄蕊内藏,花丝基部扩大有毛;子房无毛,2室。蒴果宽卵形或球形,光滑无毛,长6—7毫米,1室,4瓣裂。种子4或较少,褐色,三棱状椭圆形,长3毫米,无毛或边缘和种脐上散生丛卷毛。

产台湾、广东、广西、云南,海拔260—1000米的旷野草地或林缘。分布印度东北,锡金至泰国,经马来西亚至热带大洋洲。

4. 海南山猪菜 (海南植物志)

Merremia hainanensis Kiu, 海南植物志 3: 481, 587. 图 871. 1974.

缠绕草本。茎被黄色长硬毛。叶卵形,长3.5—7.5厘米,宽2—4厘米,顶端锐尖或渐尖,具小短尖头,基部心形,基裂片近圆形,全缘,两面无毛,侧脉7—9对;叶柄长1.5—3厘米,稍被长柔毛。花序腋生,花多数或少数,二歧聚伞花序,末次分枝单歧式,花序梗长2—3.5厘米,无毛,花梗纤细,长0.5—1.5厘米,苞片卵形,渐尖,内凹,长3—4毫米,宿存;萼片不等,无毛,外萼片椭圆形,长约9毫米,内萼片长圆形,长约10毫米;花冠淡黄色,宽漏斗状,长1.8—2厘米,瓣中带具5条褐色脉,无毛;雄蕊5,内藏,花丝长约10毫米,基部稍宽,内侧有鳞片状的边缘流苏状的附属体,花药长3—4毫米,扭转;花盘环状;子房卵状圆锥形,长约2毫米,无毛,花柱长3毫米,柱头2裂,裂片球形。蒴果未见。

产广东海南,生山坡疏林下。

本种和产于东南亚帝汶岛的 *M. dichotoma* v. Ooststr. (1939) 很相近,惟萼片较之为长,后者长4—6毫米。很可能为同一种。

5. 肾叶山猪菜 (海南植物志)

Merremia emarginata (Burm. f.) Hall. f. in Engl. Bot. Jahrb. 16: 552. 1893; *ibid.* 18: 118. 1894; Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 19: 374. 1921; Merr. et Metc. in Lingnan Sci. Journ. 16(3): 398. 1937; v. Ooststr. in Blumea 3: 312. 1939, et in Fl. Males. ser. 1, 4(4): 444. 1953; 海南植物志 3: 481. 1974.——*Evolvulus emarginatus* Burm. f. Fl. Ind. 77. t. 30. f. 1. 1768.——*Convolvulus reniformis* Roxb. Hort. Beng. 14. 1814, nom.; *id.* Fl. Ind. ed. Carey et Wall. 1: 481. 1820, et 2: 67. 1824; Wall. Cat. n. 1398. 1828.——*Ipomoea reniformis* (Roxb.) Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 446. 1833, et in DC. Prodr. 9: 351. 1845, excl. syn. Linn.; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 206. 1883.