

11. 伞花茛苕藤(广州植物志)

Merremia umbellata (Linn.) Hall. f. in Engl. Bot. Jahrb. 16: 552. 1893; ibid. 18: 114. 1894; Merr. in Philip. Journ. Sci. 1: Suppl. 120. 1906; v. Ooststr. in Blumea 3: 333. f. 1 p. f. 2 A—I. 1939, et in Fl. Males. ser. 1, 4 (4); 449. 1953; 海南植物志 3: 483. 1974. — *Convolvulus umbellatus* Linn. Sp. Pl. 155. 1753; ibid. ed. 2. 221. 1762. — *C. cymosus* Desr. in Lam. Encycl. 3: 556. 1789. — *Ipomoea cymosa* (Desr.) Roem. et Schult. in Syst. Veg. 4: 241. 1819; id. in Bot. Reg. t. 24. 1843; Choisy in DC. Prodr. 9: 371. 1845; Benth. Fl. Hongk. 238. 1861; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 211. 1883; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 159. 1890; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 251. 1915.

11a. 伞花茛苕藤(原亚种)

Merremia umbellata (Linn.) Hall. f. ssp. **umbellata**

本亚种的特征是茎较粗壮;叶大;花序梗较长,通常具多花,花较大;萼片长7—10毫米;花冠通常黄色;蒴果近球形而不为卵形至圆锥形;种子具短柔毛或短绒毛,仅边缘具稍长的毛。

分布美洲的墨西哥至巴拉圭,大小安的列斯群岛及热带西非。我国不产。

11b. 山猪菜(海南植物志)(亚种) 假红薯、小薯藤(广东), 假红薯、假番薯、山猪菜藤(广东海南),野薯藤、土瓜藤(广西) 图版 16: 3—5

Merremia umbellata (Linn.) Hall. f. ssp. **orientalis** (Hall. f.) v. Ooststr. in Fl. Males. ser. 1, 4 (4); 449. f. 24 b. 1953; 海南植物志 3: 483. 图 872. 1974; 中国高等植物志 3: 534. 图 5022. 1974. — *M. umbellata* (Linn.) Hall. f. var. **orientalis** Hall. f. in Versl's Lands Pl.-tuin 1895: 132. 1896; id. in Bull. Herb. Boiss. 5: 381. 1897. — *M. umbellata* auct. non (Linn.) Hall. f.; Merr. in Lingnan Sci. Journ 5: 154. 1927; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 812. 1936; 侯宽昭等, 广州植物志 584. 1956.

缠绕或平卧草本,平卧者下部节上生须根。茎圆柱形,有细条纹,密被或疏被短柔毛,有时无毛。叶形及大小有变化,卵形、卵状长圆形或长圆状披针形,长3.5—13.5厘米,宽1.3—10厘米,顶端钝而微凹、锐尖或渐尖,具小短尖头,基部心形,偶而稍呈戟形,全缘,叶面疏或密被灰白色或黄白色短柔毛,或仅沿中脉被毛,有时近无毛,背面毛被较密,通常沿中脉和侧脉尤密被灰白色或黄白色平展柔毛,有时毛少,侧脉6—7(—9)对,第三次脉近于平行;叶柄长短不一,长1—4(—10)厘米,疏或密被黄白色短柔毛。聚伞花序腋生,具少花或多花,呈伞形,花序梗长(0.5—)2—5(—12)厘米,毛被与叶柄相似;苞片小,披针形,早落;花芽椭圆形,顶端锐尖;花梗与花序梗近于等粗,长1—2(—3)厘米,被短柔毛;