

5朵着生于花序梗顶端成伞形聚伞花序，花序梗比叶柄短或近等长，长4—12厘米，毛被与茎相同；苞片线形，长6—7毫米，被开展的长硬毛；花梗长1.2—1.5厘米，被倒向短柔毛及长硬毛；萼片近等长，长1.1—1.6厘米，外面3片长椭圆形，渐尖，内面2片线状披针形，外面均被开展的硬毛，基部更密；花冠漏斗状，长4—6厘米，紫红色、红色或白色，花冠管通常白色，瓣中带于内面色深，外面色淡；雄蕊与花柱内藏；雄蕊不等长，花丝基部被柔毛；子房无毛，3室，每室2胚珠，柱头头状；花盘环状。蒴果近球形，直径9—10毫米，3瓣裂。种子卵状三棱形，长约5毫米，黑褐色或米黄色，被极短的糠秕状毛。

我国大部分地区有分布，生于平地以至海拔2800米的田边、路边、宅旁或山谷林内，栽培或沦为野生。本种原产热带美洲，广泛引植于世界各地，或已成为归化植物。

3. 变色牵牛(广州植物志)

Pharbitis indica (Burm.) R. C. Fang, Comb. nov. — *Convolvulus indicus* Burm. Ind. Univ. Herb. Amb. 7: 6 1755. — *C. acuminatus* Vahl, Symb. Bot. 3: 26. 1794. — *Ipomoea congesta* R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 485. 1810; Choisy in DC. Prodr. 9: 369. 1845; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 158. 1890; v. Ooststr. in Blumea 3: 500. 1940, et in Fl. Males. ser. 1, 4(4): 465. f. 39 A. 1953. — *Pharbitis insularis* Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 439. 1833, et in DC. Prodr. 9: 341. 1845. — *Ipomoea mutabilis* Ker-Gawl. in Bot. Reg. 1: t. 39. 1815; 侯宽昭等, 广州植物志 586. 1956. — *I. indica* (Burm.) Merr. Interpr. Rumph. Herb. Amb. 445. 1917.

本种在外形上和牵牛 *P. nil* (Linn.) Choisy 相似，但有以下特征易于识别：植株各部均被柔毛，或茎和花序梗被微硬毛，而无刚毛状硬毛；叶卵形或圆形，全缘或3裂，长5—15厘米，顶端渐尖或骤尖，基部心形，背面密被灰白色短而柔软贴伏的毛，叶面毛较少；花数朵聚生成伞形聚伞花序，花序梗长于叶柄，花梗短，萼片外面被贴伏的柔毛，而不象牵牛那样被刚毛；花冠蓝紫色，以后变红紫色或红色，漏斗状，长5—8厘米。

产我国台湾、广东东沙群岛及其他沿海岛屿，广州亦有栽培。原产南美洲，泛热带分布。

Hagiwara (1938) 对本种种名的组合可能是依据 E. D. Merr., Interpr. Rumph. Herb. Amb. 444 (1917) 中的 *Ipomoea indica* (Burm.) Merr., 所以基本名应来源于 *Convolvulus indicus* Burm. (1755), Hagiwara 在文中却引为 *C. indicus* Miller (1768), 这后一名称已被归入 *Ipomoea violacea* Linn. Hagiwara 那样的引证看来是错误的。