

in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 216. 1883. — *Convolvulus flavescens* D. Dietr. Syn. Pl. 1: 680. 1839. — *Ipomoea wallichii* Steud. Nomencl. ed. 2. 1: 820. 1841. — *Lepistemon obscurum* auct. non (Blanco) Merr.; Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 173. 1940.

缠绕草本，高1—3米；茎密被平展或倒向褐色疏柔毛。叶宽卵形，长5—18厘米，宽5—15厘米，先端渐尖及具小尖头，基部深心形，边缘全缘，稀具不规则齿，偶为浅3—5裂，裂片锐尖或渐尖；两面被贴生疏长柔毛，幼叶近于被金褐色绒毛；叶梗长2—16厘米，被疏长柔毛。聚伞花序簇生叶腋，少花至多花，较叶柄短，总花梗短或近无；花柄长7毫米，无毛或被疏柔毛；苞片小，早落；萼片近等长或内面1个较短小，卵形至披针形，渐尖或锐尖，长5—7.5毫米，草质，外面被长而平展的毛，果时不增大或稍增大；花冠坛状，长12—15毫米，白色或黄白色，管下部扩大，上面缢缩，管上部及冠檐的瓣中带被毛，冠檐平展，5浅裂；雄蕊着生于花冠基部凹形的具乳突的鳞片背面，鳞片拱盖着子房。花盘5裂。子房无毛，2室，柱头头状，2裂。蒴果球形或卵形，高6—8毫米，具小短尖头。种子4或更少，卵形，长3—4毫米，黑色，无毛。

产广东海南。生林下。分布印度，中南半岛，马来半岛至印度尼西亚（苏门答腊、爪哇）。

2. 裂叶鳞蕊藤 图版24: 6—8

Lepistemon lobatum Pilger in Notezbl. Bot. Gart. Berlin 9: 1029. 1926, sphalm. ut "*L. lobatus*"; Chun in Sunyatsenia 4: 267. 1940.

缠绕草本，茎或多或少被灰白色硬毛状疏柔毛。叶宽卵形，长5—8厘米，宽4—8（—10）厘米，先端长渐尖或尾状渐尖，基部深心形，边缘3—5波状浅裂或深裂，裂片近三角形，锐尖，或有时多角状浅裂，两面极疏被疏柔毛或近无毛。叶柄纤细，长达5—10厘米，毛被同茎。花数朵形成聚伞花序，总花梗较短，长约1厘米，花柄纤细，花柄及总梗均疏被硬毛状疏柔毛；萼片薄革质，绿色，卵形或卵状披针形，长5—7毫米，宽4—5毫米，锐尖，内面的稍狭，近无毛；花冠坛状，白绿色或淡黄色，长（1.8—）2—2.2厘米，管部长约1厘米，下部扩大，上部稍缢缩，冠檐扩张，直径达1.5—1.8厘米，近全缘；雄蕊短，藏于花冠管下部，花丝丝状，长约3毫米，着生于花冠基部卵状披针形或卵状三角形的鳞片背面，鳞片长约3.5毫米，宽2.5毫米，背面被乳突状疏柔毛，花丝长超出鳞片，花药椭圆形，长2毫米；子房为环状花盘包围，花盘高约1毫米，花柱短，长1.5—2毫米，柱头大，圆球头状，具乳突，稍2裂。蒴果卵形，长6—7毫米，无毛，4瓣裂，具宿存萼片。种子4粒，近卵形，长约4毫米，黑褐色，疏被淡黄褐色长柔毛，种脐圆形，在腹面基部凹下。

产浙江、福建（延平、南平、龙溪、沙县）、广东（清远、英德、连南、海南），广西（龙州、昭平等省。生于山谷疏林或枫树林中、水沟旁。模式标本采自浙江龙泉。

Hall. f. 曾发表一新种 *Lepistemon intermedius* Hall. f. in Engl. Bot. Jah-

rb. 28; 31. 1901. 产我国台湾, 分布于太平洋岛屿苏拉威西岛、新几内亚、新不列颠岛和澳大利亚昆士兰, 系根据采自我国台湾的标本 (A. Henry n. 1530), 其特点是介于 *L. binecta riferum* (Wall. ex Roxb.) O. Kuntze 与 *L. urceolatum* (R. Br.) F. V. Muell. 之间, 但叶近无毛, 上面黑色, 萼片比 *L. binectariferum* 小, 锐尖, 无因未见标本, 毛。附记于此, 留待考证。

19. 苞叶藤属 *Blinkworthia* Choisy

Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 430. t. 4. 1833.

攀援小灌木, 茎伸长, 被长柔毛或粗伏毛。叶线形或椭圆形, 背面被丝毛或粗伏毛。花序柄腋生, 短, 有花 1 朵; 萼下具苞片 3 枚, 近叶状; 萼片卵状长圆形, 近等长, 革质, 结果时稍增大; 花冠圆筒状至坛状, 或钟状, 冠檐 5 齿裂; 雄蕊内藏, 花丝基部逐渐扩大; 子房圆锥状, 无毛, 花柱丝状, 柱头头状, 2 裂。浆果为宿萼包围, 无毛。种子 1 粒, 无毛。

本属 2 种, 1 种产缅甸及泰国北部, 1 种产我国广西、云南, 分布于缅甸。


1. 苞叶藤 鸡帐蓬(云南)

Blinkworthia convolvuloides Prain in Journ. Asiat. Soc. Bot. Beng. 63(2): 91. 1894. — *B. discostigma* Hand.-Mazz. in Sinensia 2: 6. 1931; 中国高等植物图鉴 3: 541. 图 5036. 1974. syn. nov.;

攀援小灌木, 高可达 2 米, 分枝细, 木质, 先端缠绕, 被粗伏毛。叶椭圆形至长椭圆形, 长 3—4 厘米, 宽 1—1.5 厘米, 茎先端的叶较小, 先端钝圆及具小短尖, 基部近圆形; 革质, 背面被粗伏毛, 中肋在背面明显突起, 侧脉两面均不明显; 叶柄长 3—4 毫米, 稍扭曲。花序梗腋生单生, 长 0.8—1 厘米, 下弯, 单花, 中部具 3—4 个匙形小苞片, 近叶状, 长 5—6 毫米; 萼片卵圆形至圆形, 长 7 毫米, 先端钝, 边缘为膜质, 基部近心形, 被粗伏毛, 肉质, 内凹; 花冠钟形, 长约 2 厘米, 白色, 或淡绿及黄色, 中部以上具 5 条明显的瓣中带, 稍厚肉质, 间隔部分膜质; 雄蕊 5, 较花冠短一半, 贴生于花冠管近基部, 花丝丝状, 下部稍扩大而具乳突状毛; 花药长圆形至线形, 钝, 基部心形, 纵裂。花盘环状, 包围子房; 子房圆锥状, 花柱丝状, 稍短于雄蕊, 柱头盘状, 薄而具乳突。浆果卵圆形, 直径约 1 厘米, 为宿存萼片包围。种子 1 粒, 卵形, 无毛。

产云南南部及广西西南部。生于海拔 360—600 米 (—2500) 米的干热河谷的稀树乔木林及灌丛草地中。分布于缅甸。副模式采自云南元江。

根可治小儿腹胀。



图版 24:1—5. 鳞蕊藤 *Lepistemon binectariferum* (Wall. ex Roxb.) O. Kuntze, 1.花枝, 2.花冠展开, 3.雌蕊, 4.果, 5.种子; 6—8. 裂叶鳞蕊藤 *L. lobatum* Pilger, 6.花枝, 7.果, 8.种子。(李锡畴绘)