

rb. 28: 31. 1901. 产我国台湾, 分布于太平洋岛屿苏拉威西岛、新几内亚、新不列颠岛和澳大利亚昆士兰, 系根据采自我国台湾的标本 (A. Henry n. 1530), 其特点是介于 *L. binecta riferum* (Wall. ex Roxb.) O. Kuntze 与 *L. urceolatum* (R. Br.) F. V. Muell. 之间, 但叶近无毛, 上面黑色, 萼片比 *L. binectariferum* 小, 锐尖, 无因未见标本, 毛。附记于此, 留待考证。

19. 苞叶藤属 *Blinkworthia* Choisy

Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 430. t. 4. 1833.

攀援小灌木, 茎伸长, 被长柔毛或粗伏毛。叶线形或椭圆形, 背面被丝毛或粗伏毛。花序柄腋生, 短, 有花 1 朵; 萼下具苞片 3 枚, 近叶状; 萼片卵状长圆形, 近等长, 革质, 结果时稍增大; 花冠圆筒状至坛状, 或钟状, 冠檐 5 齿裂; 雄蕊内藏, 花丝基部逐渐扩大; 子房圆锥状, 无毛, 花柱丝状, 柱头头状, 2 裂。浆果为宿萼包围, 无毛。种子 1 粒, 无毛。

本属 2 种, 1 种产缅甸及泰国北部, 1 种产我国广西、云南, 分布于缅甸。

1. 苞叶藤 鸡帐蓬(云南)

Blinkworthia convolvuloides Prain in Journ. Asiat. Soc. Bot. Beng. 63(2): 91. 1894. — *B. discostigma* Hand.-Mazz. in Sinensia 2: 6. 1931; 中国高等植物图鉴 3: 541. 图 5036. 1974. syn. nov.;

攀援小灌木, 高可达 2 米, 分枝细, 木质, 先端缠绕, 被粗伏毛。叶椭圆形至长椭圆形, 长 3—4 厘米, 宽 1—1.5 厘米, 茎先端的叶较小, 先端钝圆及具小短尖, 基部近圆形; 革质, 背面被粗伏毛, 中肋在背面明显突起, 侧脉两面均不明显; 叶柄长 3—4 毫米, 稍扭曲。花序梗腋生单生, 长 0.8—1 厘米, 下弯, 单花, 中部具 3—4 个匙形小苞片, 近叶状, 长 5—6 毫米; 萼片卵圆形至圆形, 长 7 毫米, 先端钝, 边缘为膜质, 基部近心形, 被粗伏毛, 肉质, 内凹; 花冠钟形, 长约 2 厘米, 白色, 或淡绿及黄色, 中部以上具 5 条明显的瓣中带, 稍厚肉质, 间隔部分膜质; 雄蕊 5, 较花冠短一半, 贴生于花冠管近基部, 花丝丝状, 下部稍扩大而具乳突状毛; 花药长圆形至线形, 钝, 基部心形, 纵裂。花盘环状, 包围子房; 子房圆锥状, 花柱丝状, 稍短于雄蕊, 柱头盘状, 薄而具乳突。浆果卵圆形, 直径约 1 厘米, 为宿存萼片包围。种子 1 粒, 卵形, 无毛。

产云南南部及广西西南部。生于海拔 360—600 米 (—2500) 米的干热河谷的稀树乔木林及灌丛草地中。分布于缅甸。副模式采自云南元江。

根可治小儿腹胀。