

的稍小,外面密被长柔毛,内面无毛;花冠漏斗状,长4—5厘米,外面疏被柔毛,瓣中带密被长柔毛,内面无毛,冠檐5浅裂;雄蕊及花柱内藏;雄蕊着生于距花冠基部7毫米处,花丝丝状,长25毫米,基部稍扩大,密被长柔毛,花药长圆形,长约3.5毫米。花盘环状,高0.7毫米。子房无毛,花柱长32毫米,柱头头状。果圆球形,红色,4室,每室1种子。

我国广东(海南及其沿海岛屿)有分布。生于海拔250—1800米的沟谷密林中。越南,老挝,柬埔寨,泰国北部至缅甸中南部及马来半岛也有。

广东用全株治跌打损伤、内伤吐血、血崩和白带。

2. 黄毛银背藤

Argyreia velutina C. Y. Wu, 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 129. 图版 37: 2. 1965.

攀援灌木,枝近圆柱形,幼枝密被具瘤状基部俯伏的硬毡毛或黄丝状毡毛,老枝近无毛,具纵向条纹及密生小瘤点。叶近革质,椭圆形至椭圆状卵圆形,长8—11厘米,宽4—5厘米,先端锐尖,基部近圆形,叶面密被具瘤状基部俯伏硬毡毛,背面极密被丝状黄毡毛,侧脉8—12对,与中脉在叶面微突起,在背面明显突起,叶柄长2.5—3厘米,极密被丝状黄毡毛,腹面具沟。果序腋生,为具梗二歧状聚伞花序,通常具2—4果;总果梗多少四棱形,具沟,密被硬毡毛,初级总梗长2.5—3.5厘米,次级者长0.8—1.2厘米,三级者长0.6厘米,果梗长5毫米,先端稍增粗,密被硬毡毛;萼片果时卵圆形或宽椭圆形,近等大,长0.9—1.1厘米,宽0.5—0.7厘米,先端钝,外凸,外面被丝状毡毛,内面无毛。浆果扁球形,高约5毫米,宽约7毫米。种子2枚,半球形,先端圆,褐色,坚硬,种脐近圆形,在腹面近基部下陷。

产云南南部(勐海,屏边)。生于海拔960—1540米的灌丛中。模式标本采自屏边瑶山区冲头乡。

近似于银背藤 *Argyreia obtusifolia* Lour. 但叶椭圆形至椭圆状卵圆形,质厚,长8—11厘米,宽4—5厘米,叶面密被具瘤状基部俯伏的硬毡毛,背面极密被丝状黄毡毛,侧脉8—12对,萼片果时卵圆形或宽椭圆形为异。

3. 长叶银背藤 图版 26: 1—4

Argyreia henryi (Craib) Craib in Kew Bull. 1914: 9. 1914; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 284. 1915; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 132. 1965.——*Ipomoea henryi* Craib in op. cit. 1911; 423. 1911.——*Lettsomia henryi* (Craib) Kerr, Fl. Siam. Enum. 3(2): 32. 1954.

3a. 长叶银背藤(原变种)

Argyreia henryi (Craib) Craib var. *henryi*

攀援灌木,茎具棱,被稀疏的平贴硬毛。叶披针形至长披针形,长10—14(20)厘米,宽3.5—5.5(—6)厘米,先端锐尖,基部圆形,叶面无毛,或边缘及脉上疏被平贴硬毛,背面