

产云南西南部至南部。生于海拔 1120—1600 米的路边或河边灌丛。模式标本采自云南陇川飞鱼村。

7. 白花银背藤 山牡丹(云南), 葛藤、跌打王、白牛藤、白面水鸡、藤续断、旋花藤、白背藤、黄藤(广西)

*Argyreia seguinii* (Lévl.) Van. ex Lévl. Fl. Kouy-tcheou 113. 1914; id. Chine Revue 18. 1916; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 319. 1934; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 813. 1936, descr. add.; Rehd. in op. cit. 18: 242. 1937; Chun in Sunyatsenia 4: 265. 1940; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 122. 1965; 中国高等植物图鉴 3: 539. 图 5032. 1974.——*Lettsomia seguinii* Lévl. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 9: 452. 1911.——*Argyreia seguinii* Van. in herb ex Lévl. l. c., pro. syn.

藤本, 高达 3 米, 茎圆柱形、被短绒毛。叶互生, 宽卵形, 长 10.5—13.5 厘米, 宽 5.5—12 厘米, 先端锐尖或渐尖, 基部圆形或微心形, 叶面无毛, 背面被灰白色绒毛, 侧脉多数, 平行, 在叶背面突起; 叶柄长 4.5—8.5 厘米。聚伞花序腋生, 总花梗短, 长 1—2.5 厘米, 密被灰白色绒毛; 苞片明显, 卵圆形, 长及宽 2—3 厘米, 外面被绒毛, 内面无毛, 紫色; 萼片狭长圆形, 外面密被灰白色长柔毛, 长 13 毫米, 宽 5 毫米, 内萼片较小; 花冠管状漏斗形, 白色, 外面被白色长柔毛, 长 6—7 厘米, 冠檐浅裂; 雄蕊及花柱内藏, 雄蕊着生于管下部, 花丝短, 花药箭形; 子房无毛, 花柱丝状, 柱头头状。

产贵州、广西及云南东南部。生于海拔 1000—1300 米的路边灌丛。模式标本采自贵州(黄果树)。

广西以全株入药, 有驳骨、止血生肌、收敛、清心润肺、止咳、治内伤的功效。

8. 大叶银背藤 小团叶、羊角藤、猴子烟袋花(云南) 图版 27: 1—3

*Argyreia wallichii* Choisy in Mém. Soc. Phys. Genève 6: 422. 1833, et in DC. Prodr. 9: 331. 1845; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 187. 1883; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 284. 1915; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 125. 1965.——*Convolvulus erythrocarpus* Wall. Cat. n. 1413. 1829, nom. nud.

木质藤本, 茎圆柱形, 幼枝密被绒毛, 老枝被短绒毛。叶大, 卵形或多为宽心形, 长 10—25 厘米, 宽 (6—) 8—15 (—20) 厘米, 先端锐尖, 基部心形, 叶面无毛或散生伏毛, 多皱纹, 背面密被淡黄褐色绒毛, 侧脉 10—15 对, 至边缘弧形弯曲, 与中脉在叶面下陷, 背面突起; 叶柄长 5—10 (—13) 厘米, 被短绒毛。花序腋生, 多花密集成头状, 直径达 2.5—7 厘米; 总花梗极短, 最长达 2.5 厘米; 苞片大, 外面的长达 2.5 厘米或更大, 卵状长圆形, 宿存, 外面被淡黄褐色至灰白色绒毛, 内面的很小, 通常具脉; 萼片椭圆状长圆形, 长 12 毫米, 宽约 5 毫米, 外面被淡黄色长柔毛; 花冠管状漏斗形, 长 4—5 厘米, 白色, 粉红色, 稀紫色, 瓣中带