

外面被白色长柔毛,冠檐近全缘或浅裂;雄蕊及花柱内藏;花丝着生于距花冠基部9毫米处,长22毫米,基部扩大,密被长柔毛,花药长圆形,长3.5毫米;子房无毛,花柱长30毫米,柱头2头状。果圆球形,直径8—9毫米,红色。

产云南南部、中南及西南部,四川西南部。生于海拔750—1460米的混交林及灌丛中。分布于印度(东北部),锡金,缅甸(阿瓦)及泰国北部(清迈 Doi Sootep)。

根药用,治乳腺炎(云南临沧)。

9. 东京银背藤 滇一匹绸、一匹绸(云南),牛白藤、个吉芸(广西) 图版27: 6—8

*Argyreia pierreana* Bois in Rev. Hort. 78: 560. f. 208—9. 1906; id. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 4: 31. 1907, descr. reimpr.; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 278. 1915, syn. excl.; 吴征镒、李锡文,云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 124. 1965.——*A. liliiflora* C. Y. Wu 吴征镒、李锡文,云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 123. 图版36: 3. 1965. syn. nov.

木质藤本,茎及分枝圆柱形,幼枝被长柔毛,老枝无毛或被微柔毛。叶卵形,长10—20厘米,宽8—12厘米,先端锐尖,基部大多近圆形至楔形,稀略呈心形,叶面无毛,背面被白色柔软的绒毛,侧脉10—15对,在叶面印痕状,在背面突起,横脉及网脉在上面印痕状,下面稍突起;叶柄长5—12厘米,被黄色长柔毛。聚伞花序密集如头状,具总花梗,宽5—6厘米,总花梗长2—5厘米,密被黄色长柔毛;苞片形如总苞状,很大,宽卵形,钝或锐尖,长35毫米,宽20—28毫米,外面被黄色短柔毛,内面红色,内面苞片很小,次级总梗长7毫米,粗壮,花柄与次级总梗等长;萼片卵形,钝,玫瑰红色,外面被白色短柔毛,外萼片长15—17毫米,宽8毫米,内萼片长8毫米,宽3毫米;花冠漏斗状,紫红色或淡红色,长5—6厘米,冠檐直径3—4厘米,外面被白色长柔毛;雄蕊及花柱内藏;雄蕊着生于距花冠基部8毫米处,花丝丝状,基部具多数乳突,长达20毫米,花药长圆形,长4毫米;子房无毛,2室,每室2胚珠,花柱基部具关节,长达35毫米,柱头头状2裂。浆果球形,红色,直径8—10毫米,为增大的萼片包围。种子4,卵状三角形,长5毫米,子叶平行,具皱纹。


产云南东南部(西畴、广南、麻栗坡)和广西。生于海拔600—1400米的路边灌丛中。越南北部及老挝有分布。模式标本采自越南北部。

本种与大叶银背藤 *Argyreia wallichii* Choisy 极近,但老枝被微柔毛,总梗较长(2—5厘米),叶偏于长卵形,基部近圆形或楔形,极稀略心形,萼片卵圆形而不同。

藤、叶药用,治跌打损伤、风湿疼痛、内外伤出血、急慢性支气管炎、崩漏、湿疹、疮疡溃烂和乳腺炎(云南文山)等。

10. 单籽银背藤 山牵牛(云南) 图版27: 4—5

*Argyreia monosperma* C. Y. Wu 吴征镒、李锡文,云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 127. 图版37: 1. 1965.——*A. splendens* auct. non (Roxb.) Sweet, Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 39: 419. 1911.



图版 27:1—3. 大叶银背藤 *Argyreia wallichii* Choisy, 1.花枝一部分, 2.花冠展开, 3.果; 4—5. 单籽银背藤 *A. monosperma* C. Y. Wu, 4.花枝一部分, 5.花冠展开; 6—8. 东京银背藤 *A. pierreana* Bois, 6.花冠展开, 7.苞片, 8.雌蕊。(陈荫香绘)