

着生,长达15毫米,基部扩大,被褐色具腺疏柔毛,花药长圆形,长3.5毫米;花盘环状,高0.5毫米。子房无毛,圆锥形,2室,花柱丝状,基部具关节,长11毫米,柱头头状2裂。

产云南南部。生于海拔1300米的林中或灌丛草地。模式标本采自云南蒙自攀枝花。

本种近于大叶银背藤 *Argyreia wallichii* Choisy, 但叶上面无毛而平滑,侧脉10—12对,上面微突起,苞片密被蜷曲长柔毛,萼片狭长,密被丝状长柔毛为异。

13. 亮叶银背藤 图版 28: 1—3

Argyreia splendens (Roxb.) Sweet, Hort. Brit. ed. 1. 289. 1826, et ed. 2. 373. 1830; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4. 186. 1883; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 126. 1965. — *Lettsomia splendens* Roxb. Hort. Beng. 13. 1814, nom. nud.; id. Fl. Ind. ed. Carey et Wall. 2. 75. 1824, et ed. 2. 1. 487. 1832; Wall. Cat. n. 1361. — *Convolvulus splendens* Hornem. Hort. Hfin. Suppl. 123. 1819. — *Ipomoea splendens* (Roxb.) Sims in Curtis's Bot. Mag. 53: t. 2628. 1826.


攀援灌木,茎圆柱形,被灰白色绒毛,或老枝疏被白毛至近无毛。叶卵状长圆形,至椭圆形,长12—19(—23)厘米,宽5—10(—13)厘米,先端锐尖,基部圆形或宽楔形,叶面无毛,背面密被银色绢毛,全缘或微波状,中脉及侧脉在叶面下陷,背面突起,侧脉平行;叶柄长5—9.5厘米,被灰白色短绒毛,具纵条纹。聚伞花序腋生,总花梗超过叶柄,长10.5—13.5厘米,多花;苞片卵形,长约5—6毫米,宽3.5毫米,外面密被银白色绢毛;萼片5,卵形,钝,长7毫米,宽5毫米,被银色绢毛,内萼片稍小;花冠管状钟形,长4—5厘米,淡紫色,外面于瓣中带被银色绢毛,冠檐浅裂;雄蕊及花柱内藏;雄蕊在距花冠基部8.5毫米处着生,花丝丝状,长23毫米,基部扩大,被长柔毛,花药长圆形,长4.5毫米。花盘环状,高0.5毫米。子房无毛,花柱丝状,长32.5毫米,基部具关节,柱头头状,2裂。果圆球形,红色;种子4,卵状三角形,长约5毫米,褐色,种脐在基部,圆形。

产云南西部(泸水)。生于海拔1000—1400米的杂木林或灌丛中。分布于印度东北部。

14. 车里银背藤

Argyreia cheliensis C. Y. Wu, 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 126. 图版 36: 4. 1965.

攀援灌木,幼枝密被平伏淡黄色微柔毛,具棱角,老枝疏被微柔毛,具纵向细条纹,节上稍增粗,褐色。叶坚纸质,狭卵形,长7—10厘米,宽3.5—4.5厘米,先端锐尖,基部圆形,叶面无毛,背面密被丝疏柔毛,全缘而微内卷,侧脉10—13对,与中脉在叶面微突出,在背面十分突出,斜上升,在边缘内方消失;叶柄长1.7—4厘米,密被淡黄色微柔毛,自侧面压扁。花序腋生,伞房状,4—9花;总花梗长(0.7—)3—6.8厘米,密被丝状平伏微柔毛;苞片宽卵圆形,长约5毫米,宽约4毫米,先端具短尖头,外面密被丝状平伏微柔毛,内面无毛,具中脉;次级总梗长3毫米;花梗长2.5毫米;萼片卵状长圆形,长4.5毫米,宽约



图版 28:1—3. 亮叶银背藤 *Argyreia splendens* (Roxb.) Sweet, 1. 植株一部分, 2. 花冠展开, 3. 雌蕊及萼; 4—6. 叶苞银背藤 *A. roxburghii* (Wall.) Choisy var. *ample* (Wall.) C. B. Clarke, 4. 植株一部分, 5. 花冠展开, 6. 雌蕊萼片及苞片。(李锡畴绘)