

tiva (Wall.) Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 870. 1876, comb. nud.;—*L. chalmersii* Hance in Journ. Bot. Brit. et For. 16: 230. 1878; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 156. 1890.

攀援灌木,小枝通常圆柱形,被银白色绢毛,老枝黄褐色,无毛。叶椭圆形或卵形,长5—11(13.5)厘米,宽3—8(—11)厘米,先端锐尖,或钝,基部圆形或微心形,叶面无毛,背面密被银色绢毛,全缘,侧脉多至8对,在叶面不显,在叶背面中、侧脉均突起,网脉不显;叶柄长1.5—6厘米,被银色绢毛。聚伞花序腋生或顶生,总花梗长达3.5—7(8)厘米,被银色绢毛,有棱角或侧扁,次级及三级总梗长5—8毫米,具棱,被银色绢毛,花梗长5毫米,被银色绢毛;苞片椭圆形或卵圆形,钝,外面被银色绢毛,长8—12毫米,宽4—8毫米;萼片卵形,钝,外萼片长9—10毫米,宽6—7毫米,内萼片长6—7毫米,宽4—5毫米,外面被银色绢毛;花冠漏斗状,长约28毫米,白色,外面被银色绢毛,冠檐深裂,裂片长圆形,长达15毫米,先端渐尖,花冠管长6—7毫米;雄蕊着生于基部6—7毫米处,花丝长15毫米,具乳突,向基部扩大,花药长圆形,长4毫米;子房无毛,近球形,2室,每室2胚珠,花柱长2厘米,柱头头状,2裂。果球形,直径8毫米,红色,为增大的萼片包围,萼片凸起,内面红色。种子4—2,卵状三角形,长5毫米,褐色,种脐基生,心形。

广东、广西有分布,生于疏林下,或路边灌丛,河边。印度东部,越南,老挝亦有。模式标本采自广东鼎湖山。

全藤药用,有化痰止咳、润肺、止血、拔毒之功。治急慢性支气管炎、肺癆、肝硬化、肾炎水肿、疮疖、乳痈、皮肤湿疹、脚癣感染、水火烫伤、血崩、外伤止血以及治猪瘟等(广东,广西)。

20. 聚花白鹤藤 图版 29: 1

Argyreia osyrensis (Roth) Choisy in DC. Prodr. 9: 334. 1845; Merr. et Chun in Sunyatsenia 2(3—4): 312. 1935, syn. p. p. excl.; Masamune, Fl. Kainant. 271. 1934; v. Ooststr. in Blumea 7: 177. 1952, et in Fl. Males. ser. 1, 4(4): 508. 1953; 吴征镒、李锡文, 云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 136. 1965; 海南植物志 3: 495. 1974.——*Ipomoea osyrensis* Roth Nov. Pl. Sp. 117. 1821.——*Lettsomia aggregata* Roxb. var. *osyrensis* (Roth) C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 192. 1883.——*Argyreia aggregata* (Roxb.) Choisy var. *osyrensis* (Roth) Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 280. 1915

20a. 聚花白鹤藤(原变种)

Argyreia osyrensis (Roth) Choisy var. *osyrensis*

攀援灌木,茎圆柱形,密被白色或带灰色或淡褐色绒毛。叶卵形,或宽卵形至近圆形,长4—12厘米,宽4—10厘米,先端近锐尖,或钝,基部心形,叶面疏被具瘤状基部俯伏长柔毛(或无毛),背面密被灰白色绒毛至短棉毛,侧脉每边7—11,在背面突起;叶柄长2—



图版 29 1. 聚花白鹤藤 *Argyreia osyrensis* (Roth) Choisy, 花枝; 2—3. 美丽银背藤 *A. nervosa* (Burm. f.) Boj., 2. 花枝, 3. 苞片。(吴锡麟绘)