

大花萼包围。种子4粒，圆卵状三棱形，黑色，平滑无毛，种脐基生腹面，圆形，下陷。

产云南南部、广西西南部，生于海拔740—940米的草坡或竹林下。模式标本采自云南屏边一区独鸡寨。

### 21b. 少花黄伞白鹤藤(变种)

*Argyreia fulvo-cymosa* C. Y. Wu var. *pauciflora* C. Y. Wu 吴征镒、李锡文，云南热带亚热带植物区系研究报告 1: 136. 图版 20. 1965

与黄伞白鹤藤区别在于花序花较少(约9—15朵)，常紫红色，叶上面近无毛。

产云南西双版纳(勐腊易武)。生于海拔980米的林中。模式标本采自勐腊。

## 21. 腺叶藤属 *Stictocardia* Hall. f.

Hall. f. in Engl. Bot. Jahrb. 18: 159. 1894.

木质或草质藤本。叶具柄，卵形至圆形，基部通常心形，全缘，背面具小腺点，干时变成小黑点。聚伞花序腋生，有花1至多朵，具总梗；苞片小，早落；萼片5，近革质，等长或稍不等长，卵形，椭圆形或近于圆形，顶端钝或微缺，通常边缘薄，结果时增大，包围果实；花冠大型，红色或紫红色，漏斗状，瓣中带外面常被疏毛及具与叶背相同之腺点；雄蕊及花柱内藏；花丝丝状，着生于近冠管基部；花粉粒具刺。花盘环状。子房无毛，4室，每室具1胚珠，花柱1，柱头球状2裂。蒴果球形，为增大的萼片包围，果皮薄，子房隔膜突出于果表面而成2条狭翅，成熟时即沿隔膜或翅开裂成4裂瓣。种子4，被毛。

约6—7种，分布于热带地区。我国产1种。

### 1. 腺叶藤 图版 30

*Stictocardia tiliæfolia* (Desr.) Hall. f. in Engl. Bot. Jahrb. 18: 159. 1894; Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 3: 429. 1908; v. Ooststr. in Blumea 5: 346. f. 1 g—h. 1943; id. in Fl. Males. ser. 1, 4(4): 491. f. 57 c—f. 1953.——*Convolvulus tiliæfolius* Desr. in Lam. Encycl. 3: 544. 1789.——*Argyreia tiliæfolia* (Lam.) Wight, Icon. 4(2): 12. t. 1358. 1850; Kurz, For. Fl. Brit. Burma 2: 215. 1877; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 184. 1883; Gagn. et Courch. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 4: 274. 1915.——*Ipomoea campanulata* Linn. Sp. Pl. 160. 1753. syn. sub. *Ademboe* Reede (cf. v. Ooststr. in Blumea 3: 568. 1940); Choisy in DC. Prodr. 9: 359. 1845.——*Convolvulus campanulata* Spreng. Syst. 1: 608. 1825.——*Argyreia campanulata* (Linn.) Alston in Trimen. Hand.-Book Fl. Ceylon 6. Suppl. 201. 1931.——*Stictocardia campanulata* (Linn.) House in Muhlenbergia 5: 72. 1909; Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 9: 133. 1914, et Enum. Philip. Fl. Pl. 3: 372. 1923, et in Lingnan Sci.