

香,长7—8.5毫米,基部直径1.5—2毫米,向上渐渐扩张,喉部直径3—4.5毫米,裂片长圆形,长3—4毫米,反卷,比筒部短;花药长1.5—2毫米,花丝长2.5—3.5毫米,着生花冠筒基部以上3—4毫米处;花柱无毛,长5—6毫米,分枝长约1毫米。核果黄色,直径约5毫米,内果皮成熟时分裂为4个具单种子的分核。花期3月,果期4月。

分布贵州南部(罗甸)、广西西部(田林)和南部(南宁)以及云南东南部(富宁)。生海拔200—450米山地山谷林中。模式标本采自广西南宁。

7. 云贵厚壳树(中国高等植物图鉴)

Ehretia dunniana Lévl. in Repert. Sp. Nov. 11: 65. 1912; Johnst. in Journ. Arn. Arb. 32: 104. 1951; 中国高等植物图鉴 3: 546. 1974. — *Ehretia volubilis* Hand.-Mazz. in Anzeig. Akad. Wiss. Wien. Math. Naturw. Kl. 61: 164. 1924, et Symb. Sin. 7: 816. 1936.

乔木,高10—15米,胸高直径20厘米;小枝暗褐色,无毛,幼枝具细腺毛。叶长圆形或椭圆形,长10—18厘米,宽5—10厘米,先端骤尖,基部宽楔形或近圆形,无毛,侧脉6—8对,网脉明显;叶柄长2—3厘米,粗壮,无毛。聚伞花序生侧枝顶端,呈伞房状,宽6—7厘米,密生短柔毛及腺毛;花萼长3—3.5毫米,有稠密的细腺毛,裂片长圆形,长1.5—2毫米,具缘毛;花冠白色,筒状钟形,长10—11毫米,基部直径1—1.5毫米,向上渐渐扩张,喉部直径4—4.5毫米,裂片长圆形,长4—5毫米,明显比花冠筒短;花药长1.5—2毫米,花丝长2.5—3毫米,着生花冠筒基部以上5.5—6毫米处;花柱无毛,长8—8.5毫米,分枝长0.5—1毫米。核果成熟时红色至暗红色,直径约10毫米,内果皮分裂为4个具单种子的分核。花期3月,果期4月。

产云南东南部及贵州。生海拔1600米山坡疏林。模式标本采自贵州罗甸。

本种与长花厚壳树 *E. longiflora* Champ. ex Benth. 极相似,但叶的网脉明显;花序、花萼及幼枝密生锈色腺毛易于区别。

8. 屏边厚壳树(植物分类学报)

Ehretia pingbianensis Y. L. Liu, 植物分类学报 22(4): 319, 图版 1:1. 1984.

乔木,高约10米,树皮淡褐色至灰褐色,较平滑;小枝深褐色或淡褐色,无毛。叶椭圆形,卵圆形或长卵形,长7—10厘米,宽4—6厘米,先端钝或微尖,基部近圆形或为宽楔形,上下两面密生锈色短柔毛,有时近无毛,如叶片无毛时,叶缘及叶脉被短柔毛,侧脉6—8对,网脉不明显;叶柄长1—2.5厘米,密生锈色柔毛。花多数,无梗,密集为伞房状聚伞花序,花序生侧枝顶端,花期宽3—6厘米,密生锈色短柔毛;花萼钟状,长2.5—3.5毫米,比花冠筒短,裂至中部或中部稍下,外面密生锈色短柔毛,内面无毛,裂片披针形或三角状披针形,稀长圆形;花冠白色,筒状钟形,长10—11毫米,基部直径1.5毫米,檐部直径4—5毫米,外面密被锈色短柔毛,内面无毛,裂片长圆形,长2—3.5毫米,下弯,边缘反卷;雄蕊伸出花冠外,花药长圆形,长1—1.5毫米,花丝长6—7毫米,着生花冠筒中部或稍下;花