

柱长9—11毫米,伸出花冠外。核果未见。 花期4月。

产云南东南部及西南部。生海拔840—1800米山坡草地及稻田边。模式标本采自云南屏边。

9. 长花厚壳树(中国高等植物图鉴)

Ehretia longiflora Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. Bot 5: 58. 1853; Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 145. 1890; Gagnep. et Cour. in Lecomte Fl. Gén. Indo-Chine 4: 210. 1941; Johnst. in Journ. Arn. Arb. 32: 105. 1951; Li, Wood. Fl. Taiwan 812. 1963; 中国高等植物图鉴 3: 456. 图 5046. 1974; 海南植物志 3: 455. 1974; J. Y. Hsiao in Fl. Taiwan 4: 400. 1978. — *Ehretia glaucescens* Hayata, Icon. Pl. Form. 3: 153. 1913.

乔木,高5—10米,胸高直径10—15厘米;树皮深灰色至暗褐色,片状剥落;枝褐色,小枝紫褐色,均无毛。叶椭圆形、长圆形或长圆状倒披针形,长8—12厘米,宽3.5—5厘米,先端急尖,基部楔形,稀圆形,全缘,无毛,侧脉4—7对,小脉不明显;叶柄长1—2厘米,无毛。聚伞花序生侧枝顶端,呈伞房状,宽3—6厘米,无毛或疏生短柔毛;花无梗或具短梗;花萼长1.5—2毫米,无毛,裂片卵形,有不明显的缘毛;花冠白色,筒状钟形,长10—11毫米,基部直径1.5毫米,喉部直径4—5毫米,裂片卵形或椭圆状卵形,长2—3毫米,伸展或稍弯,明显比筒部短;花药长1毫米,花丝长8—10毫米,着生花冠筒基部以上3.5—5毫米处;花柱长7—8毫米,分枝长约1毫米。核果淡黄色或红色,直径8—15毫米,核具稜,分裂成4个具单种子的分核。 花期4月,果期6—7月。

产广西、广东及其沿海岛屿、福建、台湾。生海拔300—900米山地路边、山坡疏林及湿润的山谷密林。越南有分布。模式标本采自香港。

嫩叶可代茶用。

10. 宿苞厚壳树(海南植物志) 图版 2: 1—3

Ehretia asperula Zoll. et Mor. in Moritzi, Verzeichn. Zollingerpfl. 52. 1846; Johnst. in Journ. Arn. Arb. 32: 106. 1951; 海南植物志 3: 456. 1974. — *E. hanceana* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 145. 1890; Gagnep. et Cour. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 4: 207. 1914.

攀援灌木,高3—5米;枝灰褐色,粗糙,无毛,小枝褐色或淡褐色,幼嫩时被柔毛。叶革质,宽椭圆形或长圆状椭圆形,长3—12厘米,宽2—6厘米,先端钝或具短尖,基部圆,通常全缘,无毛,或下面脉腋间有簇生的柔毛;叶柄长6—15毫米,具瘤状突起。聚伞花序顶生于高年生小枝上,呈伞房状,宽4—6厘米。被淡褐色短柔毛;苞片线形或线状倒披针形,长3—10毫米,有时弯曲,宿存;花梗长1.5—3毫米,细弱;花萼长1.5—2.5毫米,被褐色短柔毛;花冠白色,漏斗形,长3.5—4毫米,基部直径1.5毫米,喉部直径5毫米,裂片三角状卵形,长2—2.5毫米,较筒部稍长;花药长约1毫米,花丝长3.5—4.5毫米,着生花冠