

灌木;茎多数,平卧或呈帚状;分枝细直,无毛或被绢丝状毛。叶互生,在节上多簇生,线状长圆形、长圆形或倒披针形,全缘或具不明显牙齿,有短柄或无柄。花小形,集为顶生的稀疏聚伞花序;花萼5裂,裂片披针形,在芽中覆瓦状排列;花冠近钟形,紫红色或粉红色,具短筒,5裂,裂片长圆形或圆形,平展,花蕾时覆瓦状排列;雄蕊5,内藏或伸出,花丝短或长,无毛,花药长圆形;子房卵球形或长圆形,4室,每室具1粒胚珠,花柱顶生,细长,不分裂,柱头扩张,稍2裂,近盾状。核果浆果状,红色,内果皮发达,早期开裂为4个具单种子的分核,分核稍坚硬。种子长圆形,无胚乳。

3种,分布于巴西、非洲及亚洲的热带地区。我国有1种,分布于广西及云南东南部、贵州西南部。

1. 轮冠木(中国种子植物科属辞典)

Rotula aquatica Lour. Fl. Cochinch. 121. 1790; Johnst. in Journ. Arn. Arb. 32: 15. 1951; 吴征镒,李锡文,云南热带亚热带植物区系研究报告 1:99. 1965. — *Ehretia viminea* Wall. [Cat. n. 906. 1829. nom. nud.] ex DC. Prodr. 9: 509. 1845. — *Caemona viminea* (Wall.) G. Don, Gen. Syst. 4: 391. 1837. — *Rhabdia viminea* Wall. ex Dalz. in Hook. Icon. pl. 5: 823. 1852. — *R. lycioides* auct. non Mart.: Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind 4: 145. 1883; Gagnep. et Cour. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 4: 214. f. 25, 15—18. 1914.

灌木,具多数细长而延伸的茎,茎灰色或黑灰色,无毛。叶长圆形或倒披针形,长0.5—2.5厘米,宽2—10毫米,近革质,两面均被糙伏毛,先端钝,具短尖,基部圆形、楔形或宽楔形,全缘;叶柄长0.5—4毫米或近无柄。花果未见。

产云南(金平、勐腊),贵州(贞丰)及广西(南宁)。生热带林区的多石溪边或岩石缝中。越南、泰国、缅甸、印度、斯里兰卡、马来西亚、菲律宾至印度尼西亚有分布。

据文献记载,花萼长4—5毫米,裂片宽0.5—1.5毫米;花冠粉红色至淡紫色,长5—7毫米,花冠筒长1—2毫米;花丝着生花冠筒中部以上;花柱长4—5毫米,子房长圆形,长约0.8毫米。核果近圆球形,直径3—4毫米。

4. 基及树属——*Carmona* Cav.

Cav. Icon. 5: 22. f. 438. 1799.

灌木或小乔木。叶小形,具短柄,两面均粗糙,上面多有白色小斑点,叶缘具粗齿,通常在当年生枝条上互生,在短枝上簇生。花生叶腋,通常2—6朵集为疏松团伞花序;花萼5裂,裂片开展;花冠白色,具短筒及平展的裂片,喉部无附属物;雄蕊5,花丝细长,花药伸出;花柱生子房顶端,2裂几达基部,2分枝细长而延伸,约与花冠等长,柱头2,小形,近头状。核果红色或黄色,先端有宿存的喙状花柱,内果皮骨质,近球形,成熟时完整,不分