

淡蓝紫色，檐部直径4—5毫米，裂片近圆形，直径约3毫米，喉部附属物5，高约0.5毫米，被短柔毛，先端凹缺；花药长圆形，长约0.5毫米，先端钝；花柱稍长于花冠筒，柱头头状。小坚果4，斜三棱锥状四面体形，褐色，平滑无毛，长约1毫米，背面宽卵形，长1—1.3毫米，具狭边，腹面的基底面略小，其余2个侧面近等大，具柄；柄长而弯曲，长约0.3毫米。

产西藏通麦。生海拔2100米山地林缘或草坡。

本种近似毛脉附地菜 *T. microcarpa* (Wall.) Benth., 但花序全部具苞片，小坚果之柄较长并向一侧弯曲可以区别。

22. 北附地菜(东北植物检索表) 图版11: 7—8; 16: 1—4


Trigonotis radicans (Turcz.) Stev. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 24, 1: 603. 1851; Kitag. Lineam. Fl. Mansh. 373. 1939; M. Pop. in Fl. URSS 19: 262. 1953; Ohwi, Fl. Japan 986. 1956; 东北植物检索表 308. 1959; 中国高等植物图鉴 3: 559. 1947. — *Myosotis radicans* Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 14: 258. 1840. — *Omphalodes sericea* Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 17: 453. 1872. — *O. aquatica* Brand in Repert. Sp. Nov. 13: 545. 1915. — *Eritrichium radicans* (Turcz.) DC. Prodr. 10: 128. 1846; Ledeb. Fl. Ross. 3: 154. 1847—49. — *T. sericea* (Maxim.) Ohwi in Journ. Jap. Bot. 12: 328. 1936. — *T. sericea* (Maxim.) Johnst. in Journ. Arn. Arb. 18: 25. 1937. — *T. radicans* (Turcz.) Stev. var. *sericea* (Maxim.) Hara in Journ. Jap. Bot. 17: 634. 1941, syn. nov.

多年生草本，全株疏生短伏毛或近无毛。茎多条丛生，开始直立，以后呈匍匐状，顶端着地生根，长达50厘米。基生叶卵形或椭圆状卵形，长3—7厘米，宽1.2—4厘米，先端急尖，基部心形或圆形，两面被细短伏毛，下面中肋显著隆起，侧脉细不明显；叶柄细长，长达18厘米；茎生叶与基生叶相似，但叶片较小，具短柄。花单生于茎生叶叶腋的上方，花梗果期长达2厘米，具贴伏短伏毛；花萼深裂，裂片宽卵形，长约3毫米，先端尖，被短伏毛，果期增大，长约5毫米；花冠淡蓝色，筒部短，长约1.2毫米，檐部直径约6毫米，裂片平展，长圆形，长约3毫米，喉部附属物5，高约0.5毫米，有短柔毛；花药椭圆形，长约0.5毫米，先端钝。小坚果4，斜三棱锥状四面体形，成熟时褐色，有短毛，背面平坦成菱形或菱状卵形，长约2毫米，先端尖，边缘具狭棱，腹面的基底面略小，有柄，柄较粗壮，长约0.8毫米，向一侧弯曲。花期6—8月；果期7—9月。

产河北东北部、辽宁、吉林、黑龙江。生山地阔叶林林缘、灌丛及溪边草地。苏联远东地区及朝鲜也有。

23. 朝鲜附地菜(东北植物检索表)

Trigonotis coreana Nakai in Bot. Mag. Tokyo 31: 218. 1917; 东北植物检索表 308. 1959; 中国高等植物图鉴 3: 559, 图 5072. 1974. — *T. nakaii* Hara in Journ.



17—18.紫齡附地菜 *Trigonotis geraldii* Brand: 小坚果腹面及背面。 19—20.多花附地菜 *T. floribunda* Johnst.: 小坚果腹面及背面。 21—22.南川附地菜 *T. laxa* Johnst.: 小坚果腹面及背面。 23—24.北附地菜 *T. radicans* (Turcz.) Stev.: 小坚果背面及腹面。 25—26.水甸附地菜 *T. myosotidea* (Maxim.) Maxim.: 小坚果背面及腹面。 27—28.蒙山附地菜 *T. tenera* Johnst.: 小坚果腹面及侧面。 29—30.细梗附地菜 *T. gracilipes* Johnst.: 小坚果腹面及背面。 31—32.毛脉附地菜 *T. microcarpa* (A. DC.) Benth.: 小坚果腹面及背面。(夏泉绘)



1—4.北附地菜 *Trigonotis radicans* (Turcz.) Stev.: 1.植物全形, 2.花萼及果实, 3.小坚果背面,
4.小坚果腹面。 5—9.细梗附地菜 *T. gracilipes* Johnst.: 5.植物全形, 6.花萼及果实, 7.小坚果背面,
8.小坚果腹面, 9.小坚果侧面。 10—13.狭叶附地菜 *T. compressa* Johnst.: 10.植物全形, 11.花萼及果
实, 12.小坚果背面, 13.小坚果腹面。(宗维城绘)