

部,稍外伸,花丝长约3毫米,花药长圆形,长约0.9毫米,钝;子房4裂,花柱长约6毫米,柱头很小,头状。小坚果4,长3—5毫米,碗状突起的边缘内折。 花果期4—5月。

产浙江、江西、湖南、山西、陕西。生林下或阴湿的岩石旁。模式标本采自浙江西天目山。

23. 皿果草属——*Omphalotrigonotis* W. T. Wang

W. T. Wang, 植物研究 4(2): 8. 1984.

一年生草本。茎直立,分枝或不分枝。叶互生,具叶柄;叶片椭圆状卵形,有短糙伏毛。镰状聚伞花序不具苞片;花有短花梗;花萼5裂至基部,裂片长圆形,果期稍增大,近平展;花冠钟状,无毛,筒部与檐部近等长,喉部具附属物;雄蕊5,着生于花冠筒中部稍上,内藏,花丝极短;子房4裂,花柱着生于子房裂片之间,不伸出花冠;雌蕊基平。小坚果四面体形,背面具皿状突起,着生面居腹面三个面的汇合处。

1种,分布于我国长江下游。

本属小坚果背面有皿状突起,是与近缘的附地菜属 *Trigonotis* Stev. 不同之处。

1. 皿果草(中国高等植物图鉴) 图版 17: 6—7

Omphalotrigonotis cupulifera (Johnst.) W. T. Wang, 植物研究 4(2): 11, 附图版, 1984; 中国高等植物图鉴 3: 562, 图 5078. 1974. — *Trigonotis cupulifera* Johnst. in Journ. Arn. Arb. 33: 69. 1952.

茎通常1条,直立或平卧,高20—40厘米,不分枝或有少数分枝,疏生短糙伏毛。叶片椭圆状卵形至狭椭圆形,长1.5—4厘米,宽1—2.3厘米,先端钝,具小尖头,基部宽楔形,两面均被短伏毛;叶柄长0.5—4厘米。镰状聚伞花序果期长可达18厘米;花梗长1—3.5毫米;花萼裂片长圆形,长约2毫米,两面都有毛,果期长达3.5毫米;花冠淡蓝色或淡紫红色,长约2.5毫米,无毛,檐部直径约4毫米,裂片宽卵形至近圆形,宽约1.8毫米,开展,喉部附属物半月形;花药长圆形,长约0.7毫米;花柱长约0.7毫米。小坚果淡黄褐色,长0.8—1毫米,平滑,有光泽,背面的皿状突起直径约1.5毫米,高约0.8毫米。 花果期5—7月。

产浙江、江西、安徽、湖南至广西的北部。生林下、山坡草丛、湿地等处。模式标本采自江西临川。

24. 山茄子属*——*Brachybotrys* Maxim.

Maxim. ex Oliv. in Hook. Icon. Pl. 13: 43. 1878.

* 中名异名: 短穗花属(中国种子植物科属辞典)。



1—2. 浙赣车前紫草 *Sinojohnstonia chekiangensis* (Migo) W.T. Wang ex Z. Y. Zhang:
 1. 植株, 2. 花冠解剖。 3—5. 短蕊车前紫草 *S. moupinensis* (Franch.) W.T. Wang ex Z.
 Y. Zhang: 3. 植株, 4. 花冠解剖, 5. 小坚果。 6—7. 血果草 *Omphalotrigonotis cupulifera*
 (Johnst.) W.T. Wang: 6. 植株, 7. 小坚果。(宗维城绘)