

sibirica Turcz. in Bull. Soc. Nat. Mosc. **13**: 7 (247). 1840. — *Mertensia denticulata* auct. non Ledeb.: Hand.-Mazz. in Öester. Bot. Zeits. **83**: 217. 1934.

多年生草本，有横走的根状茎。茎通常1条，高30—60厘米，无毛，具棱槽，仅上部花序分枝。基生叶有长叶柄，叶片卵形或卵状长圆形，长可达20厘米，肉质，无毛但背面有小凸点，先端短渐尖，基部宽楔形至微心形，侧脉弧曲，在叶下面凸起；叶柄扁平，长可达25厘米；茎生叶无柄，椭圆形至线状长圆形，长3—7厘米，宽1—2.2厘米，先端急尖或渐尖，基部渐狭。镰状聚伞花序长6—8厘米，通常2—3个组成顶生圆锥状花序，花序轴弯曲，花数不多，排列稀疏；花梗细弱，长7—22毫米，通常偏向一侧并稍向下弯，花序轴、花梗及花萼均平滑无毛；花萼钟状，长约5.5毫米，5裂至近基部，裂片狭卵形或卵状线形，先端钝；花冠蓝色，长约14毫米，筒部长约8毫米，直径约4.5毫米，檐部稍短于筒部，裂片宽卵形，稍开展，长约3.5毫米，脉明显，全缘或微波状，先端钝，喉部附属物横皱折状，高约0.25毫米；雄蕊着生附属物之下，花丝带状，长约2.5毫米，花药线状长圆形，长约3毫米，稍有短柔毛，先端钝，基部微叉开；花柱丝形，长约1.5厘米，伸出花冠约3毫米，柱头盘状。小坚果略呈肾形，长4—5毫米，白色，稍有网状皱纹，无毛。花期6—7月，果期8—9月。

产山西。生海拔2500米左右的山坡草地。西伯利亚也有分布。

族4. 齿缘草族 Trib. *Eritrichieae* Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2:836. 1876.

花冠蓝紫色，稀白色。子房4裂，有4颗胚珠；花柱不分裂；柱头1。雌蕊基金字塔状或柱状，稀平。小坚果通常4，直立或近直立，光滑、有小瘤状突起或有锚状刺，无或有边缘；着生面位于小坚果腹面下部或中部，在子房侧面或近顶端处。

26. 钝背草属——*Amblynotus* Johnst.

Johnst. in Contr. Gray Herb. n.ser. **73**:64. 1924.

多年生草本，丛生，有糙伏毛。叶互生，倒披针形，先端钝。镰状聚伞花序，有苞片；花萼5裂至基部，裂片线形，直伸，果期稍增大；花冠蓝色，筒部比萼短，檐部宽钟形，直径3—5毫米，裂片钝，覆瓦状排列，喉部有附属物；雄蕊5，着生花冠筒中部，内藏，花丝很短，花药长圆形，两端钝；子房4裂，花柱短，内藏，柱头头状；雌蕊基近平坦。小坚果直立，微弯，背面凸，无毛，有光泽，腹面纵龙骨状，着生面在腹面基部，三角形。

1种，分布苏联西伯利亚地区、蒙古及我国黑龙江和内蒙古。

1. 钝背草

Amblynotus obovatus (Ledeb.) Johnst. in Contr. Gray Herb. n. ser. **73**: 64.