

河滩或草甸上。模式标本采自青海湖附近。

31. 锚刺果属*——*Actinocarya* Benth.

Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 846. 1876. — *Glochidocaryum* W. T. Wang, 植物分类学报 6(2): 177. 1957.

一年生草本,具细弱铺散的茎,有稀疏短糙伏毛或几无毛。叶互生,倒卵状长圆形至匙形。花很小,单生叶腋,有细花梗;花萼5深裂,果时稍增大,开展;花冠辐射钟状,有短筒,檐部裂片5,开展,喉部具5个附属物;雄蕊5,着生于花冠筒,内藏,花丝极短;子房4裂,花柱短,不伸出花冠筒,柱头近头状;雌蕊基微凸。小坚果4,狭倒卵形,有锚状刺,背面凸并有部分锚状刺,基部连合而成的杯状或鸡冠状突起,着生面在腹面。

本属仅1种,分布于克什米尔地区、印度西北部、锡金及我国西南部。

1. 锚刺果(植物分类学报)

Actinocarya tibetica Benth. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 2: 846. 1876; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 155. 1883. — *Hackelia minima* Brand in Rept. Sp. Nov. 22: 104. 1926. — *Glochidocaryum kansuense* W. T. Wang, 植物分类学报 6(2): 178. 图 44, 1957. — *Actinocarya kansuensis* (W. T. Wang) W. T. Wang, 中国高等植物图鉴 3: 572, 图 5098. 1974.

茎丛生,高3—10厘米,上部疏生短伏毛,下部近无毛。基生叶倒披针形或匙形,长1.2—2.4厘米,宽1.5—4.5毫米,先端圆并有短尖头,基部渐狭,上面无毛,下面有疏短伏毛,茎生叶较小。花单生叶腋,花梗长达10毫米;花萼长约1.5毫米,裂片狭椭圆形,与花冠筒几等长,背面有短伏毛;花冠白色或淡蓝色,筒长约1.3毫米,檐部裂片近圆形,长约0.8毫米,喉部附属物浅2裂;雄蕊着生花冠筒中部,花药卵形,很小;子房4裂,花柱短,柱头头状。小坚果狭倒卵形,长1.5—2毫米,具长0.4—0.8毫米的锚状刺和短糙毛,背面有杯状或鸡冠状突起。花果期7—8月。

产西藏、青海东南部、甘肃西南部。生河滩草地、灌丛草甸等处。锡金、印度西北部、克什米尔地区也有分布。

32. 颈果草属——*Metaeritrichium* W. T. Wang

W. T. Wang, 植物分类学报 18(4): 514. 1980.

一年生小草本。花单生叶腋。花萼5裂至近基部,裂片披针形,果期稍伸长。花冠钟状筒形,檐部5裂,裂片覆瓦状排列,近圆形,附属物小,筒部稍长于檐部;雄蕊5枚;生于花冠筒中部,内藏,花药卵状三角形,花丝短;子房4裂,每室有胚珠1枚,花柱达花冠筒中

* 中名异名: 星果紫草属(中国种子植物科属辞典)。