

及。小坚果肾形,长1—1.2毫米,腹面具纵椭圆形的环状凹陷。 花果期2—10月。

产东北、华东、华南、西南各省区及陕西、河南、台湾。生海拔300—1900米山坡路边、田间草丛、山坡草地及溪边阴湿处。 朝鲜、日本、越南、印度、巴基斯坦及苏联中亚地区有分布。

多苞斑种草 *B. secundum* Maxim. 与本种近似,但茎具开展的硬毛及伏毛;苞片多数,与花依次排列,各偏于一侧而与本种相区别。

42. 长蕊斑种草属*——*Antiotrema* Hand.-Mazz.

Hand.-Mazz. in Anzeig. Akad. Wiss. Wien. Math.-Naturw. Kl.

57: 239. 1920.——*Henryetena* Brand in Repert. Sp. nov. 26:

171. 1919.

多年生草本,有短柔毛或硬毛,具莲座状的基生叶和直立有叶的茎。镰状聚伞花序集为顶生圆锥状花序;花有短花梗,无苞片;花萼5裂至下部1/3处,果期稍增大;花冠漏斗状,淡蓝色或淡紫红色,檐部裂片圆形,比筒部短2倍以上,附属物发达,着生花冠筒中部之下,长圆形,先端钝,有乳头突起;雄蕊5,伸出,等长,着生于花冠附属物之间,但花丝下部几乎一半与花冠筒部贴生,花药小,长圆形,钝;雌蕊基平坦。小坚果半卵形,直立,背面凸,有疣状突起,腹面有二层纵长的环状突起,内层膜质,外层角质化,着生面在底部,很小,圆状三角形;宿存花柱超出小坚果约2倍,胚直,直立。

1种,分布于我国西南部。

1. 长蕊斑种草 (中国高等植物图鉴) 铁打苗、狗舌草(植物名实图考), 白紫草(四川) 图版41: 4—6

Antiotrema dunnianum (Diels) Hand.-Mazz. in Anzeig. Akad. Wiss. Wien. Math.-Nat. Kl. 57: 240. 1920; Symb. Sin. 7: 825. 1936; Johnst. in Journ. Arn. Arb. 18: 25. 1936; 中国高等植物图鉴 3: 572. 图5097. 1974. ——*Cynoglossum dunnianum* Diels in Not. Bot. Gard. Edinb. 5: 168. 1912. ——*C. cavaleriei* Lévl. in Repert. Sp. Nov. 12: 534. 1913. ——*Henryetena mirabilis* Brand in Repert. Sp. Nov. 26: 171. 1929.

茎1条或2条,高10—30厘米,密生短柔毛,仅上部花序有分枝。基生叶匙形至狭椭圆形,长3—18厘米,宽1—5厘米,先端钝或急尖,两面密生具基盘的短硬毛;茎生叶较小,倒披针形至狭卵状长圆形。花序顶生,有多数或少数分枝;花多数,花梗长2—3毫米,稍下弯,花序轴、花梗及花萼都密生短柔毛;花萼长3.5—4毫米,裂片线状披针形或三角状

* 中名异名: 滇紫草属(中国种子植物科属辞典)。