

具披针形苞片;花梗长1—1.5毫米,果期增长,可达1厘米;花萼长4—5毫米,裂片线形或线状披针形,外面密伏向上的短伏毛及具基盘的硬毛,内面被疏柔毛,果期增长,可达13毫米,呈星状展开,较小坚果约长1倍;花冠蓝色,长3—5毫米,檐部直径3—6毫米,裂片圆形,喉部附属物梯形;花药长圆形,长约1毫米,花丝长约0.7毫米,着生花冠筒中部;花柱肥厚,长约1.5毫米,宽约0.5毫米。小坚果卵形或长卵形,长5—6.5毫米,密生锚状刺,边缘增厚而突起,无翅边,背面微凹,中央有明显或不明显的龙骨突起,腹面顶端有菱状卵形的着生面。 花果期6—9月。

产四川北部、青海东部、甘肃中部、南部至东部、宁夏南部。 生海拔1650—2900米山坡草地、林边草丛及农田路边。模式标本采自青海湟源。

本种与大果琉璃草 *C. divaricatum* Steph. ex Lehm. 相似,但叶绿色,线状披针形,宽1—1.5厘米,上面密生短伏毛及具基盘的硬毛;花萼裂片线形或线状披针形,果期星状展开,较小坚果约长1倍;小坚果背面凹陷,中央有龙骨状突起,而与后者区别。

6. 西南琉璃草

Cynoglossum wallichii G. Don, Gen. Syst. 4: 354. 1838; DC. Prodr. 10: 150. 1846; Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 157. 1883; Kazmi in Journ. Arn. Arb. 52: 345. 1971. — *C. edgeworthii* DC. Prodr. 10: 150. 1846. — *C. denticulatum* DC. Prodr. 10: 150. 1846; Clarke in l. c. — *C. micranthum* Hook. f. et Thoms. ex Clarke in l. c.

6a. 西南琉璃草

Cynoglossum wallichii G. Don var. ***wallichii***

二年生直立草本,高20—60厘米,稀达70厘米。茎单一或数条丛生,密生基部具基盘的硬毛及伏毛,多由上部分枝,分枝细长,叉形开展。基生叶及茎下部叶具柄,披针形或倒卵形,长2—5厘米,宽0.5—1.2厘米,茎中部及上部叶近无柄或无柄,渐渐狭小,两面均被稀疏散生的硬毛及伏毛。花序顶生及腋生,叉状分枝,无苞,花期紧密,果期伸长可达20厘米,呈总状;花梗花期短,果期稍增长,长约5毫米,下弯;花萼长2—2.5毫米,外面密生向上贴伏的柔毛,裂片卵形或长圆形,直立,长约2毫米,宽约0.5毫米,果期稍增大,边缘密生缘毛;花冠蓝色或蓝紫色,钟形,长3—4毫米,檐部直径2.5—4.5毫米,裂片圆形,网脉明显,喉部有5个梯形附属物,附属物长约0.7毫米,边缘密生短柔毛;花药长圆形,长0.8—1毫米,宽约0.5毫米,花丝短,着生花筒近中部。小坚果卵形,先端圆或尖,长3—4毫米,宽2.5—3毫米,背面凹陷,有稀疏散生的锚状刺,边缘锚状刺基部极扩张,连合成宽翅边。 花果期5—8月。

产云南西北、四川西南、西藏东南及甘肃南部。生海拔1300—3600米山坡草地、荒野路边及密林阴湿处。阿富汗、巴基斯坦、克什米尔地区及印度有分布。

6b. 倒钩琉璃草(变种) 图版40: 4—5