

檐部直径 2—2.5 毫米,喉部有 5 个半月形附属物;花药卵圆形,长 0.5 毫米;花柱肥厚,四棱形,果期长约 1 毫米,较花萼为短。小坚果卵球形,长 2—2.5 毫米,背面突,密生长短不等的锚状刺,边缘锚状刺基部不连合。 花果期 4—9 月。

主产西南、华南及华东,河南、陕西及甘肃南部也有。生海拔 300—2800 米丘陵、山坡草地及路边。阿拉伯、巴基斯坦、克什米尔地区、印度、尼泊尔、缅甸、泰国、菲律宾、琉球群岛及非洲有分布。

全草入药,用于清热解毒,利尿消肿,活血。主治急性肾炎,月经不调,外用治痈肿疮毒及毒蛇咬伤。

44. 长柱琉璃草属*——*Lindelofia* Lehm.

Lehm. in Hamburg. Gartenzeitung 6: 351. 1850.

多年生直立草本,有短柔毛或长柔毛。叶全缘;基生叶长,有叶柄;茎生叶互生。镰状聚伞花序无苞片;花萼 5 裂至近基部,裂片线形、披针形或线状长圆形,果时稍增大;花冠漏斗状,筒部通常长于萼,檐部裂片钝,近直伸,喉部附属物长形,弯曲,或为长圆形,很少为短缩的卵形,不裂;雄蕊着生喉部之下,具短花丝,花药长形,基部常为戟形,伸出喉部;花柱丝形,伸出花冠外,果期增粗宿存;雌蕊基短圆锥形。小坚果背腹扁,卵形,背面具盘状突起,有锚状刺,着生面在腹面靠上部,卵形,与雌蕊基的组织贴合牢固(小坚果不易脱落)。

本属约 10 种,分布于亚洲的中部和西部。我国产 1 种。

1. 长柱琉璃草(中国高等植物图鉴) 狗爪草(甘肃)

Lindelofia stylosa (Kar. et Kir.) Brand in Engl. Pflanzenr. IV. 252 (Heft 78): 85. 1921; M. Pop. in Fl. URSS 19: 633. 1953; Голосок в Фл. Казахст. 7: 276. 1964; Riedl in Reching. Fl. Iranica 48: 141. 1967; Kazmi in Journ. Arn. Arb. 52: 337. 1971; 中国高等植物图鉴 3: 575. 图 5014. 1974. ——*Cynoglossum stylosa* Kar. et Kir. in Bull. Soc. Nat. Mosc. 15: 409. 1842. ——*Solenanthus nigricans* Schrenk ex Fisch. et Mey. Enum. Pl. Nov. 2: 29. 1842. ——*Lindelofia benthami* Hook. f. in Fl. Brit. Ind. 4: 159. 1885.

根粗壮,直径约 2 厘米。茎高 20—100 厘米,有贴伏的短柔毛,上部通常分枝。基生叶长可达 35 厘米,叶片长圆状椭圆形至长圆状线形,长 8—25 厘米,两面疏生短伏毛,基部渐狭,叶柄扁,有狭翅,几无毛;下部茎生叶近线形,有柄;中部以上茎生叶无柄或近无柄,狭披针形。花序初时长 3—7 厘米,果期伸长可达 20 厘米,花序轴、花梗、花萼都密生

* 中名异名: 菱蒂萝属(中国种子植物科属辞典)。