

花辐射对称或两侧对称,组成聚伞花序,常紧缩成头状,外包有花瓣状总苞片;雄蕊4,子房2室;子叶不折叠。全世界约有3属,我国均产。

2. 六苞藤属*——*Symphorema* Roxb.

Roxb. Pl. Corom. 2: 46. t. 186. 1798.

攀援灌木;茎近圆柱形或微四方形。单叶对生,具柄,全缘或具齿,侧脉彼此近平行,被毛或无毛。聚伞花序头状,具总梗,有7枚无柄的花及6枚长椭圆形基部分离的总苞片,总苞片在果时常增大;花萼倒卵形,杯状或钟状,3—8齿,果时增大;花冠小,白色,花冠管圆柱形,无毛或喉部有长柔毛环,裂片6—16—(18),近相等,狭长圆形;雄蕊与花冠裂片同数而等长,伸出花冠外;花丝线形,无毛;花药卵圆形、长圆状椭圆形,背部着生,2室平行;子房倒卵形,2或不完全4室,每室有2并生悬垂胚珠,仅1枚能育;花柱丝状,柱头2裂,常超过雄蕊。蒴果近干燥,包藏于增大的萼内;1种子,直立,无胚乳;子叶肉质,富含油质。

4种。间断分布于印度、缅甸、泰国、菲律宾。其中1种延至我国云南南部。

模式种:六苞藤 *Symphorema involucreatum* Roxb.

1. 六苞藤 (云南植物志) 图版 1

Symphorema involucreatum Roxb. Pl. Corom. 2: 46. t. 186. 1798; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 599. 1885; P. Dop in Lecomte, Fl. Gen. Indochine 4: 898. 1936; 云南植物志 1: 492, 图版 118, 3. 1977.

攀援状木质藤本;小枝圆柱形,有显著皮孔,幼时被星状毛。叶片卵圆形或近椭圆形,长约10厘米,宽约6厘米,顶端钝至短尾状渐尖,基部近圆钝或常为微心形,表面幼时被微柔毛,后几无毛,背面密被星状绒毛,侧脉4—5对;叶柄短,长5—15毫米。聚伞花序头状,有长达7厘米的花序梗,花序梗被星状毛;总苞片6枚,椭圆形至匙形,全缘,纸质,被脱落性星状短绒毛,花时长1—1.7厘米,宽0.2—0.5厘米,果时长达3.5厘米,宽达1.5厘米;花萼管状,长4—5毫米,外面被星状绒毛,内面无毛,5—6浅裂,裂片外卷,长约1毫米,顶端钝;花冠白色,长6—8毫米,6—8裂,除外面顶端有少数长毛外,余无毛,裂片线状长圆形,钝,长2—3毫米;雄蕊6—8,稀更多,约与花冠裂片等长,花丝线形,无毛,花药长椭圆形;子房倒卵形,无毛,无腺点;花柱伸出,线形,柱头显著2裂,裂片展开,圆柱状。果近球形,无毛,长4—6毫米,为宿存纸质萼筒所包。

产云南南部(勐腊、景洪)。生于海拔500—800米的灌丛或疏林中。间断分布于印度至斯里兰卡(栽培)及缅甸北部以至泰国。

* 六苞藤属(云南植物志)。