

3. 马鞭草亚科——VERBENOIDEAE BRIQ.

Briq. in Engler et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3a): 144. 146. 1897.

花序穗状或总状；花由下向上开放形成无限花序；种子无胚乳。全世界有5族36属，我国有4族6属。

1. 马鞭草族——VERBENEAE BRIQ.

Euverbeneae Briq. in Engler et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4 (3a): 146. 1897.

花稍两侧对称，无柄或近无柄，形成穗状或近头状花序，在花后延伸；雄蕊4或2；子房由2心皮组成4室，每室有1胚珠。全世界有6属，我国有1属。

5. 马鞭草属* —— *Verbena* Linn.

Linn. Sp. Pl. 18. 1753.

一年生、多年生草本或亚灌木。茎直立或匍匐，无毛或有毛。叶对生，稀轮生或互生，近无柄，边缘有齿至羽状深裂，极少无齿。花常排成顶生穗状花序，有时为圆锥状或伞房状，稀有腋生花序，花后因穗轴延长而花疏离，穗轴无凹穴；花生于狭窄的苞片腋内，蓝色或淡红色；花萼膜质，管状，有5棱，延伸出成5齿；花冠管直或弯，向上扩展成开展的5裂片，裂片长圆形，顶端钝、圆或微凹，在芽中覆瓦状排列；雄蕊4，着生于花冠管的中部，2枚在上，2枚在下，花药卵形，药室平行或微叉开；子房不分裂或顶端浅4裂，4室，每室有1直立向底部侧面着生的胚珠；花柱短，柱头2浅裂。果干燥包藏于萼内，成熟后4瓣裂为4个狭小的分核。种子无胚乳，幼根向下。

约250种，除2—3种产东半球外，全部产于热带至温带美洲；我国除野生1种外，庭园常见栽培有美女樱 *Verbena hybrida* Voss 及细叶美女樱 *Verbena tenera* Spreng.

模式种：马鞭草 *V. officinalis* Linn.

1. 马鞭草（名医别录） 铁马鞭（华东、华南），马鞭子（云南），马鞭稍（滇南本草、四川），透骨草、蛤蟆棵、兔子草（江苏），粘身蓝被、土马鞭、风须草（广东），蜻蜓草、蜻蜓饭（浙江、福建） 图3

Verbena officinalis Linn. Sp. Pl. 20. 1753; Schauer in DC. Prodr. 11: 547. 1847; Benth, Fl. Hongk. 286. 1861; Debeaux in Act. Soc. Linn. Bordeaux 30: 48. 1875 et 31: 345. 1877; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 31: 73.

* 马鞭草属（植物分类学报）。

1886; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 256. 1890; Diels in Engler Bot. Jahrb. 29: 547. 1900; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. Ser. 10: 202. 1912; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 156. 1927; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 7. 1932; 裴鉴, 中国药用植物志 1: 图 37. 1955; 侯宽昭等, 广州植物志 624. 图 330. 1956; 裴鉴等, 江苏南部种子植物手册, 623. 图 1010. 1959; 中国高等植物图鉴 3: 578. 图 5109. 1974; 海南植物志 4: 2. 图 943. 1977; 云南植物志 1: 392. 图版 93, 1—2. 1977.—*Verbena officinalis* Linn. var. *ramosa* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 10: 440. 1912.

多年生草本, 高 30—120 厘米。茎四方形, 近基部可为圆形, 节和棱上有硬毛。叶片卵圆形至倒卵形或长圆状披针形, 长 2—8 厘米, 宽 1—5 厘米, 基生叶的边缘通常有粗锯齿和缺刻, 茎生叶多数 3 深裂, 裂片边缘有不整齐锯齿, 两面均有硬毛, 背脉上尤多。穗状花序顶生和腋生, 细弱, 结果时长达 25 厘米; 花小, 无柄, 最初密集, 结果时疏离; 苞片稍短于花萼, 具硬毛; 花萼长约 2 毫米, 有硬毛, 有 5 脉, 脉间凹穴处质薄而色淡; 花冠淡紫至蓝色, 长 4—8 毫米, 外面有微毛, 裂片 5; 雄蕊 4, 着生于花冠管的中部, 花丝短; 子房无毛。果长圆形, 长约 2 毫米, 外果皮薄, 成熟时 4 瓣裂。花期 6—8 月, 果期 7—10 月。




图 3 马鞭草 *Verbena officinalis* Linn.
(史渭清绘)

产山西、陕西、甘肃、江苏、安徽、浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、四川、贵州、云南、新疆、西藏。常生长在低至高海拔的路边、山坡、溪边或林旁。全世界的温带至热带地区均有分布。

全草供药用, 性凉, 味微苦, 有凉血、散瘀、通经、清热、解毒、止痒、驱虫、消肿的功效。

2. 马缨丹族——LANTANEAE BRIQ.

Briq. in Engler et Prantl, Nat. Pflanzenfam 4 (3a): 149. 1897.

花辐射对称或稍两侧对称, 形成由下向上开的穗状花序; 雄蕊 4 或 2。果实有 2 分核, 每核 1 室, 每室有 1 种子。全世界有 17 属, 我国有 3 属。