

6. 马缨丹属*——*Lantana* Linn.

Linn. Sp. Pl. 626. 1753.

直立或半藤状灌木，有强烈气味；茎四方形，有或无皮刺与短柔毛。单叶对生，有柄，边缘有圆或钝齿，表面多皱。花密集成头状，顶生或腋生，有总花梗；苞片基部宽展；小苞片极小；花萼小，膜质，顶端截平或具短齿；花冠4—5浅裂，裂片钝或微凹，几近相等而平展或略呈二唇形，花冠管细长向上略宽展；雄蕊4，着生于花冠管中部，内藏，花药卵形，药室平行；子房2室，每室有1胚珠；花柱短，不外露，柱头偏斜，盾形头状。果实的中果皮肉质，内果皮质硬，成熟后，常为2骨质分核。

约150种，主产热带美洲。我国除下列1种外，庭园还常栽培蔓马缨丹 *L. montevidensis* Briq.。

模式种：马缨丹 *L. camara* Linn.

1. 马缨丹（种子植物名称） 五色梅（华北），五彩花（福建），臭草、如意草（广东、广西、福建），七变花（华北经济植物志要） 图4

Lantana camara Linn. Sp. Pl. 627. 1753; Schauer in DC. Prodr. 11: 598. 1847; Benth. Fl. Hongk. 268. 1861; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. P'etersb. 31: 73. 1886; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 351. 1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. Ser. 10: 201. 1912; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 225. 1924; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 157. 1927; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 9. 1932; 陈嵘, 中国树木分类学, 1102, 图 990. 1937; 侯宽昭等, 广州植物志 625, 图 331. 1956; 中国高等植物图鉴 3: 578. 图 5110. 1974; 海南植物志 4: 3. 图 944. 1977; 云南植物志 1: 394, 图版 94, 1—3. 1977.——*Lantana aculeata* Linn. Sp. Pl. 627. 1753. pro parte.

直立或蔓性的灌木，高1—2米，有时藤状，长达4米；茎枝均呈四方形，有短柔毛，通常有短而倒钩状刺。单叶对生，揉烂后有强烈的气味，叶片卵形至卵状长圆形，长3—8.5厘米，宽1.5—5厘米，顶端急尖或渐尖，基部心形或楔形，边缘有钝齿，表面有粗糙的皱纹和短柔毛，背面有小刚毛，侧脉约5对；叶柄长约1厘米。花序直径1.5—2.5厘米；花序梗粗壮，长于叶柄；苞片披针形，长为花萼的1—3倍，外部有粗毛；花萼管状，膜质，长约1.5毫米，顶端有极短的齿；花冠黄色或橙黄色，开花后不久转为深红色，花冠管长约1厘米，两面无短毛，直径4—6毫米；子房无毛。果圆球形，直径约4毫米，成熟时紫黑色。全年开花。

原产美洲热带地区，现在我国台湾、福建、广东、广西见有逸生。常生长于海拔80—

* 马缨丹属(中国树木分类学)。