

1938; 张宏达, 植物分类学报 1: 283. 1951; 侯宽昭等, 广州植物志 630. 图 336. 1956; Moldenke in Phytologia 21 (4): 214—226. 1971; 云南植物志 1: 403. 图版 96, 9—12. 1977.——*Callicarpa incana* Roxb. Fl. Ind. 1: 939. 1820.——*Callicarpa roxburghii* Wall. List. no. 1833, 1829, nom. nud. non Walp.——*Callicarpa dunniana* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 456. 1911.——*Callicarpa macrophylla* Vahl var. *kouytchensis* Lévl. Fl. Kouytcheou 440. 1915.

灌木, 稀小乔木, 高 3—5 米; 小枝近四方形, 密生灰白色粗糠状分枝茸毛, 稍有臭味。叶片长椭圆形、卵状椭圆形或长椭圆状披针形, 长 10—23 厘米, 宽 5—11 厘米, 顶端短渐尖, 基部钝圆或宽楔形, 边缘具细锯齿, 表面被短毛, 脉上较密, 背面密生灰白色分枝茸毛, 腺点隐于毛中, 侧脉 8—14 对, 细脉在表面稍下陷; 叶柄粗壮, 长 1—3 厘米, 密生灰白色分枝的茸毛。聚伞花序宽 4—8 厘米, 5—7 次分歧, 被毛与小枝同, 花序梗粗壮, 长 2—3 厘米; 苞片线形, 萼杯状, 长约 1 毫米, 被灰白色星状毛和黄色腺点, 萼齿不明显或钝三角形; 花冠紫色, 长约 2.5 毫米, 疏生星状毛; 花丝长约 5 毫米, 花药卵形, 药隔有黄色腺点, 药室纵裂; 子房被微柔毛, 花柱长约 6 毫米。果实球形, 径约 1.5 毫米, 有腺点和微毛。花期 4—7 月, 果期 7—12 月。

产广东、广西、贵州、云南。生于海拔 100—2000 米的疏林下和灌丛中。尼泊尔、锡金、不丹、马斯克林群岛、留尼汪岛、印度、孟加拉、缅甸、泰国、越南、马来西亚和印度尼西亚也有分布。

叶或根可作内外伤止血药, 治跌打肿痛、创伤出血、肠道出血, 咳血、鼻衄(《广东中草药》、《江西草医草药》、《广西中草药》); 广西用叶作绿肥(《云南植物志》)。

9. 尖叶紫珠 (植物分类学报) 图 12

Callicarpa acutifolia H. T. Chang, 植物分类学报 1 (1): 284. 1951; Moldenke in Phytologia 13 (6): 473. 1966 et 20 (8): 489. 1971.

灌木; 小枝四棱形, 被星状柔毛和稠密的黄色腺点, 两叶柄之间有横线联合。叶片披针形或长椭圆状披针形, 长 11—16 厘米, 宽 2—5 厘米, 两端尖, 表面有柔毛, 以脉上较密, 背面被星状毛, 两面密生黄色腺点, 通常不脱落, 侧脉 9—13 对, 边缘有细齿; 叶柄长 1.5 厘米。聚伞花序宽 7—9 厘米, 7—8 次分歧, 花序梗粗壮, 长 3—5.5 厘米; 花萼长约 1 毫米, 近截头状, 无毛; 花冠长约 2.5 毫米, 无毛; 花丝长约 4 毫米, 花药卵形, 药室纵裂; 子房无毛, 有腺点。果实球形, 径约 1.5 毫米, 干后黑褐色。花期 7—9, 果期 10 月。


产广东(广州黄埔、云浮)、广西(桂林雁山)。生于山坡、河边。模式标本采自广东云浮县云雾山。

本种和尖尾枫 *C. longissima* (Hemsl.) Merr. 相似, 但后者小枝节上有柔毛环, 叶片背面无毛, 腺点脱落后呈小蜂窝状洼点; 花序较小, 花序梗也较短。

广西雁山, 钟树权 A61264 号标本, 除花序梗较模式标本稍短外, 其余特征均同。

10. 尖萼紫珠 (植物分类学报) 图 13

Callicarpa lobo-apiculata Metc. in Lingn. Sci. Journ. 11: 406. 1932; Merr. et Chun in Sunyats. 5: 178. 1940; 张宏达, 植物分类学报 1 (1): 277. 1951; Moldenke in Phytologia 16: 453—454. 1968; 海南植物志 4: 9. 1977. — *Callicarpa macrophylla* P'ei in Sinensia 2: 66. 1931, pro parte, quoad specim. Y. Tsiang 6371, non Vahl — *Callicarpa roxburghii* P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 18—21. 1932, pro parte, quoad specim. Hongk., non Wall.

图 12 尖叶紫珠 *Callicarpa acutifolia*

H. T. Chang (史渭清绘)

图 13 尖萼紫珠 *Callicarpa lobo-apiculata*

Metc. (韦力生绘)

灌木, 高达 3 米; 小枝、叶柄和花序密生黄褐色分枝茸毛。叶片椭圆形, 长 12—22 厘米, 宽 5—7 厘米, 顶端渐尖, 基部楔形, 边缘有浅锯齿, 表面初有星状毛和分枝毛, 后脱落, 仅脉上有毛, 背面密生黄褐色星状毛和分枝茸毛, 两面有细小黄色腺点; 叶柄粗壮, 长 2—3 厘米。聚伞花序宽 4—6 厘米, 5—6 次分岐; 花序梗粗壮, 长 1—1.5 厘米; 花柄长约 1 毫米; 苞片细小; 花萼钟状, 稍被星状毛或无毛, 萼齿急尖, 齿长 0.5—1 毫米; 花冠紫色, 长约 2.5 毫米, 顶端 4 裂, 裂片常有毛; 花丝长约 3.5 毫米, 花药椭圆形, 药室纵裂。果实径约 1.2 毫米, 具黄色腺点, 无毛。花期 7—8 月, 果期 9—12 月。

产湖南、广东、广西、贵州。生于海拔 300—500 米的山坡或谷地溪旁林中。模式标本采自香港。

本种和枇杷叶紫珠 *C. kochiana* Makino 相似, 但后者花序紧密, 花几无柄; 花萼密