


10. 尖萼紫珠 (植物分类学报) 图 13

Callicarpa lobo-apiculata Metc. in Lingn. Sci. Journ. 11: 406. 1932; Merr. et Chun in Sunyats. 5: 178. 1940; 张宏达, 植物分类学报 1 (1): 277. 1951; Moldenke in Phytologia 16: 453—454. 1968; 海南植物志 4: 9. 1977. — *Callicarpa macrophylla* P'ei in Sinensia 2: 66. 1931, pro parte, quoad specim. Y. Tsiang 6371, non Vahl — *Callicarpa roxburghii* P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 18—21. 1932, pro parte, quoad specim. Hongk., non Wall.

图 12 尖叶紫珠 *Callicarpa acutifolia*

H. T. Chang (史渭清绘)

图 13 尖萼紫珠 *Callicarpa lobo-apiculata*

Metc. (韦力生绘)

灌木, 高达 3 米; 小枝、叶柄和花序密生黄褐色分枝茸毛。叶片椭圆形, 长 12—22 厘米, 宽 5—7 厘米, 顶端渐尖, 基部楔形, 边缘有浅锯齿, 表面初有星状毛和分枝毛, 后脱落, 仅脉上有毛, 背面密生黄褐色星状毛和分枝茸毛, 两面有细小黄色腺点; 叶柄粗壮, 长 2—3 厘米。聚伞花序宽 4—6 厘米, 5—6 次分歧; 花序梗粗壮, 长 1—1.5 厘米; 花柄长约 1 毫米; 苞片细小; 花萼钟状, 稍被星状毛或无毛, 萼齿急尖, 齿长 0.5—1 毫米; 花冠紫色, 长约 2.5 毫米, 顶端 4 裂, 裂片常有毛; 花丝长约 3.5 毫米, 花药椭圆形, 药室纵裂。果实径约 1.2 毫米, 具黄色腺点, 无毛。花期 7—8 月, 果期 9—12 月。

产湖南、广东、广西、贵州。生于海拔 300—500 米的山坡或谷地溪旁林中。模式标本采自香港。

本种和枇杷叶紫珠 *C. kochiana* Makino 相似, 但后者花序紧密, 花几无柄; 花萼密

被分枝毛,裂片尖长,萼管几全部包藏果实;和大叶紫珠 *C. macrophylla* Vahl 相比,后者萼齿不明显或钝三角形;小枝、叶柄和花序被灰白色粉状分枝毛。

11. 白毛紫珠 (植物分类学报) 图 14

Callicarpa candicans (Burm. f.) Hochr. in Candollea 5: 190. 1934; A. Meeuse in Blumea 5: 71. 1942; Moldenke in Phytologia 21 (1): 32. 1971; 海南植物志 4: 9—10. 1977.——*Urtica candicans* Burm. f. Fl. Ind. 197. 1768.——*Callicarpa cana* Linn. Mant. 2: 198. 1771; Schauer in DC Prodr. 11: 643. 1847; C. B. Clarke in Hook. f. Brit. Ind. 4: 569. 1885; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 252. 1890; Craib in Kew Bull. 442. 1911; Lam, Verb. Malay Archip. 68. 1919; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 157. 1927; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 25. 1932; P. Dop in Lecomte, Fl. Gen. L'Indo-Chine 4: 793. 1935; Moldenke in Fedde, Repert. Sp. Nov. 40: 109. 1936; Fletch. in Kew Bull. 413; 1938; 张宏达,植物分类学报 1 (1): 285. 1951.——*Callicarpa americana* Lour. Fl. Cochinch. 70. 1790, non Linn.——*Callicarpa tomentosa* Lamk. Encycl. 1: 562. 1783, non (Linn.) Murr.——*Callicarpa sinensis* Hort. ex Steud. Nom. Bot. ed. 2: 257. 1840.

灌木,高1—2米;小枝四棱形,密生灰白色星状茸毛。叶片卵状椭圆形、宽卵形或椭圆形,长8—15厘米,宽4—7厘米,顶端渐尖或急尖,基部骤狭成楔形,边缘有锯齿,表面无毛或叶脉上有毛,绿色,干后变黑褐色,背面密生灰白色星状茸毛,侧脉9—13对,中脉、侧脉和细脉在背面隆起,在表面下陷;叶柄长1—1.5厘米。聚伞花序紧密成球形,宽2—3厘米,4—5次分歧,花序梗长0.5—1厘米,被毛与小枝同;苞片细小,线形;花萼密生灰白色星状厚茸毛,萼齿不明显;花冠粉红色或红色,疏生星状毛,长约2毫米,花丝长为花冠的2倍,花药小,卵形,药室纵裂;子房无毛。果实球形,紫黑色,干后黑色,径约2毫米。花果期4—12月。




图 14 白毛紫珠 *Callicarpa candicans*
(Burm. f.) Hochr. (蒋杏墙绘)

产广东。生于平原、山坡、路旁或空旷荒芜之地。分布于印度、缅甸、泰国、越南、