

点,侧脉8—10对,细脉近平行排列,网脉细而密,边缘具三角形的锐锯齿;叶柄长约6毫米,被星状毛。聚伞花序1—3次分歧,有花3—9朵,花序梗长约5毫米,被星状毛;苞片线形;花柄无毛;花萼杯状,长约1毫米,无毛,顶端近截头状或有不明钝齿;花冠紫红色,长约4毫米,无毛;雄蕊长约5毫米,花药椭圆形,长约1毫米,药室纵裂,子房球形,无毛。果未见。花期6月。

产四川屏山。生于海拔700—1600米的山地林中。模式标本采自屏山县龙华。

本种与老鸦糊 *C. giraldii* Hesse ex Rehd. 相似,但它的小枝紫褐色,有明显的线状皮孔,有层出现象,叶片背面近无毛,基部通常钝,花序短小,花少数,萼管短,顶端近截头状,花冠管状,长约4毫米,花的各部分近无毛,而与后者有明显差异。

22. 尖尾枫 (植物分类学报) 粘手风、穿骨枫(广西)、雪突、牛舌广(福建)

***Callicarpa longissima*** (Hemsl.) Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 12: 108. 1917 et in Lingn. Sci. Journ. 6: 285. 1928; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 226. 1924; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 49. 1932; P. Dop in Lecomte, Fl. Gen. L'Indo-Chine 4: 802. 1935; 张宏达,植物分类学报 1 (1): 293. 1951; 侯宽昭等,广州植物志 631. 1956; Li, Woody Fl. Taiwan 823. 1963; Moldenke in Phytologia 21 (4): 210—214. 1971, pro parte, excl. syn. "*C. longissima* (Hemsl.) Merr. f. *subglabra* P'ei"; 中国高等植物图鉴 3: 584, 图 5121. 1974.——*Callicarpa longifolia* Lamk. var. *longissima* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 253. 1890; Hayata, Icon. Pl. Formos. 2: 125, f. 36. 1912; Kanehira, Formos. Trees ed. 2: 642. 1936.

22a. 尖尾枫 (原变型)

f. ***longissima***

灌木或小乔木,高1—3—(7)米;小枝紫褐色,四棱形,幼嫩部分稍有多细胞的单毛,节上有毛环。叶披针形或椭圆状披针形,长13—25厘米,宽2—7厘米,顶端尖锐,基部楔形,表面仅主脉和侧脉有多细胞的单毛,背面无毛,有细小的黄色腺点,干时下陷成蜂窝状小洼点,边缘有不明显的小齿或全缘;侧脉12—20对,在两面隆起,惟网脉在背面深下陷;叶柄长1—1.5厘米。花序被多细胞的单毛,宽3—6厘米,5—7次分歧,花小而密集,花序梗长1.5—3厘米;花萼无毛,有腺点,萼齿不明显或近截头状;花冠淡紫色,无毛,长约2.5毫米;雄蕊长约为花冠的2倍,药室纵裂;子房无毛。果实扁球形,径1—1.5毫米,无毛,有细小腺点。花期7—9月,果期10—12月。

产台湾、福建、江西、广东、广西、四川。生于海拔1200米以下的荒野、山坡、谷地丛林中。越南也有分布。模式标本采自广州近郊。

全株供药用,有止血镇痛、散瘀消肿、祛风湿的效用,治外伤出血、咯血、吐血、产后风、四肢瘫痪、风湿痹痛等。