

同。模式为果标本,花的构造不知,根据果序特征,属于纵裂药系的可能性大,现暂放于此,待将来采到花标本时再予研究。




图 24 上狮紫珠 *Callicarpa siong-saiensis* Metc. (蒋杏墙绘)




图 25 长毛紫珠 *Callicarpa pilosissima* Maxim. (史渭清绘)

27. 长毛紫珠 (植物分类学报) 图 25

Callicarpa pilosissima Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Péterb. 31: 75. 1887; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 254. 1890; Kanehira, Formos. Trees ed. 2: 645, f. 602. 1936; 张宏达, 植物分类学报 1 (1): 291. 1951; 中国高等植物图鉴 3: 584, 图 5122. 1974; Moldenke in Phytologia 21 (7): 459—461. 1971.——*Callicarpa pilosissima* Maxim. var. *henryi* Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agr. 6: 554. 1934.——*Callicarpa acuminatissima* Liu et Tseng in Quart. Journ. Taiwan Mus. 10: 56. t. 1, 2. 1957, non Teijsm. et Binn.

灌木;小枝、叶柄和花序梗均密生黄褐色多细胞的长毛。叶片狭披针形,长10—18厘米,宽2—3厘米,顶端长尖,基部微心形或浑圆,表面毛较短而疏,背面密生黄褐色多细胞的长毛,杂有分枝毛,并具细小黄色腺点,边缘疏生不明显的小齿;叶柄长约5毫米。聚伞花序宽2—3厘米,3—4次分岐;花序梗长1—1.5厘米,花柄长约1毫米;花萼长约1毫米,被长毛,萼齿钝三角形;花冠长约2毫米,无毛;雄蕊长4—5毫米,花药细小,近圆形,药室纵裂;子房有毛和腺点。果实球形,径约1毫米,成熟后具明显皱纹和腺点。花期

10 月,果期 11—12 月。

特产我国台湾省。生于高地或山坡林中。

本种小枝、叶柄、花序和叶片背面均密生黄褐色多细胞的长毛;叶狭长披针形,基部微心形或浑圆,易于识别。

28. **紫珠** (云南植物志) 珍珠枫、漆大伯(四川),大叶鸦鹊饭(江西),白木姜(贵州),爆竹紫(安徽)

Callicarpa bodinieri Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 456. 1911 et Fl. Kouy-Tscheou 439. 1915; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 321. 1934; Hand.-Mazz. in Symb. Sin. 7: 900. 1936; P'ei in Bot. Bull. Acad. Sinica 1: 3. 1947; 张宏达,植物分类学报 1(1): 288. 1951, pro parte; Moldenke in phytologia 20(8): 496—497, 1971, excl. specim. J. F. Rock 9195 & 21(7): 445. 1971; 中国高等植物图鉴 3: 585 图 5124. 1974; 云南植物志 1: 404 图版 97, 1—4. 1977.——*Callicarpa longifolia* Forbes & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 253. 1890, pro parte, quoad specim. A. Henry 3999, non Lamk.——*Callicarpa sequini* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 455. 1911 et Fl. Kouy-Tscheou 440. 1915.——*Callicarpa feddei* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 10: 439. 1912.——*Callicarpa giraldiana* Hesse var. *subcanescens* Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 368, 1916, pro parte; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1(3): 34. 1932, pro parte.——*Callicarpa tonkinensis* P. Dop in Trav. Lab. For. Toulouse 1: art. 21, 12. 1932.——*Callicarpa bodinieri* Lévl. var. *giraldii* auct non (Rehd.) Rehd.; 张宏达,植物分类学报 1(1): 289. 1951, pro parte.——*Callicarpa tsiangii* Moldenke in Phytologia 3: 109—110 et 22(5): 285. 1971, syn. nov.

28a. **紫珠** 图 26

var. **bodinieri**

灌木,高约 2 米;小枝、叶柄和花序均被粗糠状星状毛。叶片卵状长椭圆形至椭圆形,长 7—18 厘米,宽 4—7 厘米,顶端长渐尖至短尖,基部楔形,边缘有细锯齿,表面于干暗棕褐色,有短柔毛,背面灰棕色,密被星状柔毛,两面密生暗红色或红色细粒状腺点;叶柄长 0.5—1 厘米。聚伞花序宽 3—4.5 厘米,4—5 次分歧,花序梗长不超过 1 厘米;苞片细小,线形;花柄长约 1 毫米;花萼长约 1 毫米,外被星状毛和暗红色腺点,萼齿钝三角形;花冠紫色,长约 3 毫米,被星状柔毛和暗红色腺点;雄蕊长约 6 毫米,花药椭圆形,细小,长约 1 毫米,药隔有暗红色腺点,药室纵裂;子房有毛。果实球形,熟时紫色,无毛,径约 2 毫米。花期 6—7 月,果期 8—11 月。

产河南(南部)、江苏(南部)、安徽、浙江、江西、湖南、湖北、广东、广西、四川、贵州、云南。生于海拔 200—2300 米的林中、林缘及灌丛中。越南也有分布。模式标本采自贵州