

叶片狭披针形或披针形，长 5—14 厘米，宽 0.8—3 厘米，顶端渐尖，基部宽楔形或钝圆，两面除主脉稍有星状毛外，余无毛，背面及花的各部分均被紫黑色粒状腺点，侧脉 8—12 对，边缘具不明显的疏齿；叶柄长 2—4 毫米。聚伞花序紧密，宽 1—2 厘米，3—4 次分歧，花序梗长约 5 毫米；苞片细小，线形；花萼杯状，无毛，萼齿不明显或截头状；花冠紫色，开放时长约 3 毫米；雄蕊长约 5 毫米，花药长圆形，药室纵裂；子房疏被灰白色星状毛。果实球形，径约 2 毫米。 花果期 6—11 月。

产四川西部和南部、云南西北部。生山坡林中。模式标本采自四川。

本种叶片及花的各部分均被紫黑色粒状腺点与紫珠 *C. bodinieri* Lévl. 相似，但后者叶片多为椭圆形，基部楔形可明显区别。

30. 红腺紫珠 (植物分类学报)

Callicarpa erythrosticta Merr. et Chun in Sunyats. 5: 178. pl. 27. 1940; Moldenke in Phytologia 14 (3): 184. 1966; 张宏达, 植物分类学报 1 (1): 294. 1951; 海南植物志 4: 12. 1977.

灌木，高约 2 米；小枝灰色，圆柱形，被星状毛和红褐色粒状腺点。叶片椭圆状披针形或卵状长椭圆形，长 4—8 厘米，宽 1—2.5 厘米，顶端长尾状尖，基部楔形，表面无毛，背面密生红褐色腺点，主脉上有星状毛，侧脉 5—8 对，边缘中部以上疏生尖齿；叶柄长 2—5 毫米。聚伞花序宽约 1 厘米，约 2 次分歧，花序梗长约 5 毫米；苞片线形；花萼长约 1 毫米，密生红褐色腺点，顶端截头状，花冠白色或带粉红色，长约 2.5 毫米；雄蕊伸出花冠管外，药室纵裂；子房无毛而有红褐色腺点。果实球形，径约 2 毫米，疏生红褐色腺点。 花果期 4—5 月。

特产广东海南岛。生于海拔 425—1400 米的谷地林中。

31. 厚萼紫珠 (新拟) 图 27

Callicarpa hungtaii P'ei et S. L. Chen, nom. nov. — *Premna angustifolia* H. T. Chang, 中山大学学报(自然科学版) 1: 33. 1960, non King et Gamble (1908).

直立亚灌木或灌木；嫩枝被粉屑状星状毛。叶薄革质，长圆状披针形，长 3—6 厘米，宽 1—1.6 厘米，顶端尾状尖，基部楔形，表面深绿色，除主脉外余无毛，背面淡绿色，无毛，具红褐色腺点，侧脉 5—6 对，与网脉在两面均明晰可见，边缘中部以上具 3—6 粗齿；叶柄长约 2 毫米。腋生聚伞花序宽约 1 厘米，1—2 次分歧，有花 1—7 朵；花序梗长 3—5 毫米，花柄长约 2 毫米，均被粉屑状星状毛；花萼外面具红褐色腺点，结果时增厚；花未见。果实近球形，径约 3 毫米，内有 4 分核。

产广东。生于山坡路旁荫湿的密林中。模式标本采自阳春。

1960 年张宏达将广东黄志 41890 号标本定名 *Premna angustifolia*，我们看到该号标本为腋生聚伞花序，果实有 4 分核等特征非豆腐柴属所有，而是紫珠属的特征。本种与红腺紫珠 *C. erythrosticta* Merr. et Chun 近似，但因叶片薄革质，花萼于结果时增