

雄蕊长约为花冠的2倍,花药卵形,长约1毫米,药室纵裂;子房无毛。果实球形,紫红色,径1.5—2毫米。花期6—7月,果期8—12月。

产安徽(黄山)、江西、福建、广东。生于海拔300—500米的山坡灌丛或疏林中。模式标本采自福建南平。

本种全体被多细胞的腺毛和单毛,叶片的大小、形状均近似钝齿红紫珠 *C. rubella* Lindl. f. *crenata* P'ei, 但后者萼齿钝,齿长不超过0.3毫米;叶近于无柄,可以区别。

Moldenke (1962) 根据刘心祈3927号标本,以其小枝、叶片、花序及花的各部分被毛较长,花序分枝基部开展成直角等特征,成立一新变种,这些变异并不稳定,与原种比较区别甚微,不足以成立变种。

33. 红紫珠 (静生生物调查所汇报) 小红米果(云南),漆大伯、空壳铁砂子、空壳树(四川),复生药、对节树(贵州)

*Callicarpa rubella* Lindl. in Bot. Reg. 11: t. 883. 1825; Schauer in DC. Prodr. 11: 645. 1847; Benth. Fl. Hongk. 271. 1881; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 4: 569. 1885; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb. 31: 75. 1886; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 255. 1890; Dunn et Tutch. in Kew Bull. Add. Ser. 10: 202. 1912; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 369. 1916; pro parte, excl. specim. A. Henry 9412; Lam, Verb. Malay Archip. 53. 1919; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 38. 1932; Cotton in Curtis's Bot. Mag. 157. t. 9340. 1934; Fletch. in Kew Bull. 414. 1938; 张宏达, 植物分类学报 1: 296. 1951; Moldenke in Phytologia 21 (7): 480—489. 1971, pro parte, excl. syn. *C. rubella* Lindl. f. *crenata* P'ei et *C. rubella* Lindl. f. *angustata* P'ei; 中国高等植物图鉴 3: 585 图 5123. 1974; 云南植物志 1: 410 图版 98, 6—10. 1977.——*Callicarpa tenuifolia* Champ. in Hook. Kew Journ. Bot. 5: 135. 1853.——*Callicarpa rubella* Lindl. var. *hemsleyana* Diels in Bot. Jahrb. 29: 547. 1900; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 370. 1916; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 40. 1932 et in Bot. Bull. Acad. Sinica 1: 4. 1947; Moldenke in Phytologia 2 (7): 290—292. 1971.——*Viburnum dielsii* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 433. 1911.——*Callicarpa panduriformis* Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 9: 455. 1911.——*Callicarpa dielsii* (Lévl.) P'ei in Mem. Sci. Soc. Chins 1 (3): 37. 1932.——*Callicarpa rubella* Lindl. var. *dielsii* (P'ei) Li in Journ. Arn. Arb. 25: 425. 1944, pro parte, quoad specim. W. T. Tsang 21319; Moldenke in Phytologia 21 (7): 489—490. 1971, pro parte.

33a. 红紫珠 (原变种) 图 29

var. *rubella*