

下的山坡、谷地的丛林中。模式标本采自广东乐昌。

本种和紫珠 *C. bodinieri* Lévl. 及窄叶紫珠 *C. japonica* Thunb. var. *angustata* Rehd. 相似。和前一种的区别为叶片无毛,花序细弱,子房无毛,花丝等于或稍长于花冠,药室孔裂;和后一种的区别为叶片被红色腺点,叶缘密具细锯齿。



图 30 华紫珠 *Callicarpa cathayana* H. T. Chang (蒋杏墙、史渭清绘)



图 31 多齿紫珠 *Callicarpa dentosa* (H. T. Chang) W. Z. Fang (史渭清绘)

35. 多齿紫珠 (植物分类学报) 图 31

Callicarpa dentosa (H. T. Chang) W. Z. Fang, comb. nov. — *Callicarpa brevipes* (Benth.) Hance var. *dentosa* H. T. Chang 植物分类学报 1 (1): 300. 1951; Moldenke in *Phytologia* 20 (8): 498—499. 1971. — *Callicarpa brevipes* (Benth.) Hance. f. *yingtakensis* H. T. Chang 植物分类学报 1 (1): 301. 1951, quoad specim. L. Teng 145, non P'ei.

小灌木;幼枝紫褐色,被星状毛,老枝灰褐色,无毛。叶片椭圆形或长圆状披针形,长16—25厘米,宽5—7厘米,顶端短尖,基部楔形或钝,边缘疏生小齿,表面无毛,或中脉略有微毛,背面常带紫色,密被紫红色粒状腺点,脉上有星状毛,侧脉8—9对,弯拱上升;叶柄长约4毫米。聚伞花序紧密,宽约1厘米,2—3次分枝,花序梗短于叶柄,花柄长约1.5毫米;苞片细小;花萼杯状,近无毛,有紫红色腺点,顶端近截头状;花冠白色,近无毛,有紫红色腺点,长约3.5毫米;花丝短于花冠;花药长圆形,药室孔裂;子房无毛。果实球形,径约2.5毫米。花期6—7月,果期7—9月。

产广东韶关地区。生于山坡溪边密林中。模式标本采自清远。

本种与短柄紫珠 *C. brevipes* (Benth.) Hance 相似,但它的叶片为椭圆形,与花萼、花冠均密生紫红色腺点可以区别。

36. 丘陵紫珠 (植物分类学报) 图 32

Callicarpa collina Diels in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 9: 1030. 1926; P'ei in Mém. Sci. Soc. China 1 (3): 48, pl. 5. 1932; 张宏达,植物分类学报 1 (1): 302. 1951; Moldenke in Phytologia 14 (3): 147. 1966 et 21 (1): 33. 1971.——

Callicarpa brevipes (Benth.) Hance f. *yingtakensis* P'ei in Mém. Sci. Soc. China 1 (3): 47. 1932; 张宏达,植物分类学报 1 (1): 301. 1951, pro parte, excl. L. Teng 145.

灌木,高1—2米;小枝圆柱形,被黄褐色星状毛;叶片倒披针形或长椭圆状倒披针形,长12—19—(25)厘米,宽3—6—(8)厘米,顶端渐尖或急尖,基部楔形或宽楔形,表面无毛和腺点,背面疏生黄褐色星状毛,沿主脉较密,腺点黄色,细小,通常不明显;边缘疏生浅齿;叶柄长约5毫米。聚伞花序短小而紧密,宽1—1.5厘米,2—3次分岐;花序梗长约5毫米,疏生黄褐色星状毛;苞片细小,钻形;花柄长约1.5毫米,无毛;花萼长约1.2毫米,无毛,萼齿短;花冠白色或微带淡红紫色,长约3毫米,裂片圆钝;花丝短于花冠,花药长圆形,稍突出花冠外,药室孔裂,子房球形,无毛。果实球形,径约2毫米。花期5—7月,果期6—8月。

产江西南部、广东。生于海拔700—1000米的山坡林下。模式标本采自资溪。




图 32 丘陵紫珠 *Callicarpa collina* Diels

(陈荣道绘)

自 Diels (1926) 发表本种以来,后来的文献大都根据原始记载描述。经我们对江西资溪,胡先骕 1250 (同号模式标本照片)和近年采得的、模式产地的标本(聂敏祥 3418)以及龙南,采集人不详 892;井岗山,赖书坤 4417 等号标本进行研究,认为它与鼎湖紫珠 *C. tingwuensis* H. T. Chang 和短柄紫珠 *C. brevipes* (Benth.) Hance 均极相似,它和前者的区别是,叶片通常为倒披针形;花的各部分及子房均无毛;和后者的区别是,花序较小而紧密,叶片背面被毛较多等,但差异并不十分明显,因此,有可能是短柄紫珠偏北分布的一个类型。