

广东从化,曾怀德 20606; 增城,曾怀德 20416 号标本,除叶片基部圆钝和本种稍有区别外,其他特征均同,亦应属于本种。

37. 鼎湖紫珠 (植物分类学报) 图 33

Callicarpa tingwuensis H. T. Chang, 植物分类学报 1: 302. 1951.

灌木,高约 1.5 米;嫩枝被黄褐色星状毛。叶片椭圆形或长椭圆形,长 14—20 厘米,宽 5—8.5 厘米,顶端渐尖,基部稍歪斜,钝圆或宽楔形,表面脉上有短毛,背面被星状柔毛,侧脉 10—12 对,边缘有小齿尖;叶柄长 1—1.5 厘米,被星状毛。聚伞花序 3—4 次分枝,宽 1.5—2.5 厘米,被黄褐色星状毛,花序梗长约 5 毫米,花柄长约 1 毫米;苞片细小,花萼长约 1 毫米,截头状,外被星状毛,花冠白色,长 3—4 毫米,稍被细毛,花丝短于花冠,花药长圆形;长约 1.5 毫米,顶端孔裂;子房密被星状毛;花柱长约 5 毫米。果实径约 3 毫米,外被星状毛。 花期 5 月,果期 9—10 月。

产广东(鼎湖山)。生于林中。模式标本采自鼎湖山。

本种叶片形状变化较大,但通常为椭圆形或长椭圆形,其花序特征和叶片被毛的情况与短柄紫珠 *C. brevipes* (Benth.) Hance 及丘陵紫珠 *C. collina* Diels 相似。它和这二种的主要区别为花的各部分被毛,子房有毛,果实亦有毛。



图 33 鼎湖紫珠 *Callicarpa tingwuensis*
H. T. Chang (史渭清绘)



图 34 峦大紫珠 *Callicarpa randaiensis* Hayata
(史渭清绘)