

f. *kiruninsularis* Masam. in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 30: 64. 1940; 张宏达, 植物分类学报 1 (1): 304. 1951.——*Callicarpa japonica* Thunb. var. *luxurians* Masam. apud H. T. Chang, 植物分类学报 1 (1): 304. 1951.

未见标本, 根据原始记载与原变种区别是: 叶片厚纸质, 卵状披针形, 长约 5 厘米, 宽约 2 厘米, 基部渐狭, 顶端尖锐。

特产我国台湾基隆。

42. 广东紫珠 (植物分类学报) 图 38

Callicarpa kwangtungensis Chun in Sunyats. 1: 302. 1934; 张宏达, 植物分类学报 1 (1): 306. 1951; 中国高等植物图鉴 3: 587. 图 5127. 1971; 云南植物志 1: 412. 图版 98, 11—15. 1977.——*Callicarpa brevipes* sensu Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 901. 1936, pro parte, non (Benth.) Hance——*Callicarpa japonica* Thunb. var. *angustata* Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 3: 369. 1936, pro parte, excl. specim. Wils. 2195.

灌木, 高约 2 米; 幼枝略被星状毛, 常带紫色, 老枝黄灰色, 无毛。叶片狭椭圆状披针形、披针形或线状披针形, 长 15—26 厘米, 宽 3—5 厘米, 顶端渐尖, 基部楔形, 两面通常无毛, 背面密生显著的细小黄色腺点, 侧脉 12—15 对, 边缘上半部有细齿; 叶柄长 5—8 毫




图 38 广东紫珠 *Callicarpa kwangtungensis*

Chun (陈荣道绘)

米。聚伞花序宽2—3厘米,3—4次分歧,具稀疏的星状毛,花序梗长5—8毫米,花萼在花时稍有星状毛,结果时可无毛,萼齿钝三角形,花冠白色或带紫红色,长约4毫米,可稍有星状毛;花丝约与花冠等长或稍短,花药长椭圆形,药室孔裂;子房无毛,而有黄色腺点。果实球形,径约3毫米。花期6—7月,果期8—10月。

产浙江、江西、湖南、湖北、贵州、福建、广东、广西、云南。生于300—600(—1600)米的山坡林中或灌丛中。模式标本采自广东北江地区。

本种和窄叶紫珠 *C. japonica* Thunb. var. *angustata* Rehd. 相似,但后者叶片较小,倒卵状披针形,背面腺点不显著。花序分歧较少可以区别。

43. 异叶紫珠 (新拟) 图版9

Callicarpa sinisophylla C. Y. Wu ex W. Z. Fang in Addenda.

亚灌木或灌木,高达0.3—1米;小枝圆柱形,稍被灰黄色星状短毛,常有层出现象。叶片薄膜质,狭披针形或线状披针形,两侧略不等宽,向一侧弯曲,长10—33厘米,宽1.5—4.5厘米,顶端渐尖,基部收窄下延成狭楔形,表面疏生短毛,中脉上较多,背面无毛,密生鳞片状黄色腺点,侧脉9—12对,弯拱上举,边缘疏生小齿突或近全缘,对生叶可不同大小;叶柄短,长不超过0.5厘米。聚伞花序短小,宽0.5—1厘米,1—2次分歧,花序梗长约3毫米,被星状短毛和黄色腺点,花柄长约2毫米,花无毛,而有黄色腺点,有披针形苞片;花萼杯状,长约1.2毫米,萼齿钝三角形;花冠白色,长约3毫米;花丝短,仅花药突出花冠外,花药椭圆形,长约1.5毫米,背部被黄色腺点,药室顶端孔裂。果实球形或稍带椭圆形,径约2毫米。花果期6—8月。

产贵州、广西。生于海拔900—1300米的山坡或山顶密林中。模式标本采自贵州榕江。

本种小枝有层出现象,叶片薄膜质,披针形或狭披针形,两侧不等宽,而向一侧弯曲,而且同对叶片可不同大小,叶片、小枝、花序及花的各部分均密被鳞片状黄色腺点,在本组中较为特殊,易与其他种区别。

44. 光叶紫珠 (新拟) 绿英柴(安徽) 图39

Callicarpa lingii Merr. in Journ. Arn. Arb. 8: 16. 1927; P'ei in Mém. Sci. Soc. China 1 (3): 47. Pl. 4. 1932; 张宏达,植物分类学报 1 (1): 303. 1951. — *Callicarpa longifolia* P. Court. Fl. Ngan-Hoei 97. 1906—1922, non Lamk.

灌木,高约1.5米;幼枝紫褐色,微有星状毛,老枝圆柱形,灰褐色,无毛。叶片倒卵状长椭圆形或长椭圆形,长13—18厘米,宽3—5厘米,顶端渐尖或急尖,中部以下收窄,基部近心形,两面无毛或表面有微毛,背面密生细小的黄色腺点,侧脉10—12对,边缘具小齿或近全缘;叶柄极短或近无柄。聚伞花序细弱,宽约2.5厘米,2—4次分歧,被黄褐色星状毛;花序梗长约4—8毫米;苞片线状披针形;花萼杯状,长约2毫米,无毛或微有星状