

米。聚伞花序宽 2—3 厘米, 3—4 次分歧, 具稀疏的星状毛, 花序梗长 5—8 毫米, 花萼在花时稍有星状毛, 结果时可无毛, 萼齿钝三角形, 花冠白色或带紫红色, 长约 4 毫米, 可稍有星状毛; 花丝约与花冠等长或稍短, 花药长椭圆形, 药室孔裂; 子房无毛, 而有黄色腺点。果实球形, 径约 3 毫米。花期 6—7 月, 果期 8—10 月。

产浙江、江西、湖南、湖北、贵州、福建、广东、广西、云南。生于 300—600 (—1600) 米的山坡林中或灌丛中。模式标本采自广东北江地区。

本种和窄叶紫珠 *C. japonica* Thunb. var. *angustata* Rehd. 相似, 但后者叶片较小, 倒卵状披针形, 背面腺点不显著。花序分歧较少可以区别。

43. 异叶紫珠 (新拟) 图版 9

Callicarpa sinisophylla C. Y. Wu ex W. Z. Fang in Addenda.

亚灌木或灌木, 高达 0.3—1 米; 小枝圆柱形, 稍被灰黄色星状短毛, 常有层出现象。叶片薄膜质, 狭披针形或线状披针形, 两侧略不等宽, 向一侧弯曲, 长 10—33 厘米, 宽 1.5—4.5 厘米, 顶端渐尖, 基部收窄下延成狭楔形, 表面疏生短毛, 中脉上较多, 背面无毛, 密生鳞片状黄色腺点, 侧脉 9—12 对, 弯拱上举, 边缘疏生小齿突或近全缘, 对生叶可不同大小; 叶柄短, 长不超过 0.5 厘米。聚伞花序短小, 宽 0.5—1 厘米, 1—2 次分歧, 花序梗长约 3 毫米, 被星状短毛和黄色腺点, 花柄长约 2 毫米, 花无毛, 而有黄色腺点, 有披针形苞片; 花萼杯状, 长约 1.2 毫米, 萼齿钝三角形; 花冠白色, 长约 3 毫米; 花丝短, 仅花药突出花冠外, 花药椭圆形, 长约 1.5 毫米, 背部被黄色腺点, 药室顶端孔裂。果实球形或稍带椭圆形, 径约 2 毫米。花果期 6—8 月。

产贵州、广西。生于海拔 900—1300 米的山坡或山顶密林中。模式标本采自贵州榕江。

本种小枝有层出现象, 叶片薄膜质, 披针形或狭披针形, 两侧不等宽, 而向一侧弯曲, 而且同对叶片可不同大小, 叶片、小枝、花序及花的各部分均密被鳞片状黄色腺点, 在本组中较为特殊, 易与其他种区别。

44. 光叶紫珠 (新拟) 绿英柴 (安徽) 图 39

Callicarpa lingii Merr. in Journ. Arn. Arb. 8: 16. 1927; P'ei in Mém. Sci. Soc. China 1 (3): 47. Pl. 4. 1932; 张宏达, 植物分类学报 1 (1): 303. 1951. — *Callicarpa longifolia* P. Court. Fl. Ngan-Hoei 97. 1906—1922, non Lamk.

灌木, 高约 1.5 米; 幼枝紫褐色, 微有星状毛, 老枝圆柱形, 灰褐色, 无毛。叶片倒卵状长椭圆形或长椭圆形, 长 13—18 厘米, 宽 3—5 厘米, 顶端渐尖或急尖, 中部以下收窄, 基部近心形, 两面无毛或表面有微毛, 背面密生细小的黄色腺点, 侧脉 10—12 对, 边缘具小齿或近全缘; 叶柄极短或近无柄。聚伞花序细弱, 宽约 2.5 厘米, 2—4 次分歧, 被黄褐色星状毛; 花序梗长约 4—8 毫米; 苞片线状披针形; 花萼杯状, 长约 2 毫米, 无毛或微有星状

毛，萼齿钝三角形或近截头状，花冠紫红色，近无毛，长约4毫米；花丝短于花冠，花药长圆形，长约1.5毫米，药室孔裂；花柱略长于雄蕊。果实倒卵形或卵形，径约2.5毫米，有黄色腺点。花期6月，果期7—10月。

产江西、安徽(南部)、浙江。生于海拔300米的丘陵或山坡上。模式标本采自江西婺源。

本种和短柄紫珠 *C. brevipes* (Benth.) Hance 区别极微，所不同者为后者叶片通常披针形，背面在主脉上有星状毛，果实为球形。




图 39 光叶紫珠 *Callicarpa lingii* Merr. (蒋杏墙绘)

45. 罗浮紫珠 (植物分类学报)

Callicarpa oligantha Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 13: 155. 1918; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 226. 1924; P'ei in Mém. Sci. Soc. China 1 (3): 44. pl. 3. 1932; 张宏达, 植物分类学报 1 (1): 307. 1951; Moldenke in Phytologia 21 (6): 378—379. 1971. — *Callicarpa japonica* Thunb. var. *dichotoma* Bakh. in Bull. Jard. Buitenz. 3: 26. 1921. pro parte.

细弱灌木，高2—3米；幼枝疏生星状柔毛，老枝无毛或近无毛，圆柱形，淡灰色。叶片狭披针形，纸质，长6—12厘米，宽0.8—1.5厘米，表面平滑无毛，无腺点，暗棕绿色，光亮，背面淡灰白色，有显著的腺点；无毛或幼时沿主脉疏生星状柔毛，基部楔形，顶端渐尖或突尖，边缘2/3处以上有明显锯齿，侧脉7—9对，弯拱上举，网脉细，不突起；叶柄长约2毫米。聚伞花序腋生，有花2—3朵，花序梗长约2毫米或近无梗。果球形或近球形，干