

毛，萼齿钝三角形或近截头状，花冠紫红色，近无毛，长约4毫米；花丝短于花冠，花药长圆形，长约1.5毫米，药室孔裂；花柱略长于雄蕊。果实倒卵形或卵形，径约2.5毫米，有黄色腺点。花期6月，果期7—10月。

产江西、安徽(南部)、浙江。生于海拔300米的丘陵或山坡上。模式标本采自江西婺源。

本种和短柄紫珠 *C. brevipes* (Benth.) Hance 区别极微，所不同者为后者叶片通常披针形，背面在主脉上有星状毛，果实为球形。




图 39 光叶紫珠 *Callicarpa lingii* Merr. (蒋杏墙绘)

45. 罗浮紫珠 (植物分类学报)

Callicarpa oligantha Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 13: 155. 1918; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1 (1): 226. 1924; P'ei in Mém. Sci. Soc. China 1 (3): 44. pl. 3. 1932; 张宏达, 植物分类学报 1 (1): 307. 1951; Moldenke in Phytologia 21 (6): 378—379. 1971. — *Callicarpa japonica* Thunb. var. *dichotoma* Bakh. in Bull. Jard. Buitenz. 3: 26. 1921. pro parte.

细弱灌木，高2—3米；幼枝疏生星状柔毛，老枝无毛或近无毛，圆柱形，淡灰色。叶片狭披针形，纸质，长6—12厘米，宽0.8—1.5厘米，表面平滑无毛，无腺点，暗棕绿色，光亮，背面淡灰白色，有显著的腺点；无毛或幼时沿主脉疏生星状柔毛，基部楔形，顶端渐尖或突尖，边缘2/3处以上有明显锯齿，侧脉7—9对，弯拱上举，网脉细，不突起；叶柄长约2毫米。聚伞花序腋生，有花2—3朵，花序梗长约2毫米或近无梗。果球形或近球形，干

后暗棕色,横径 3—3.5 毫米,无毛,宿萼截头状,无毛。果柄长不超过 4 毫米。

产广东(罗浮山)。生于海拔 900 米小溪边丛林中。模式标本采自罗浮山。

自 Merrill 发表本种以后,尚未采到过这个种的标本,上文系译自原始记载。Merrill 在野外记录上称:“稀少,只见到一单株”。根据记载和模式照片 (Merrill 11060),我们认为本种与窄叶紫珠 *C. japonica* Thunb. var. *angustata* Rehd. 或短柄紫珠 *C. brevipes* (Benth.) Hance 相似,所不同者仅为花序简单,有花 2—3 朵,花柄亦较长。因此,它可能是上两种在特殊生境条件下的一个异常发育类型。

亚属 2. 钩毛紫珠亚属——Subgen. *Peiantha* Chun et S. L. Chen, in *Addenda*.

植物体被基部膨大顶端具钩的小糙毛。叶片较小,近无柄。聚伞花序简单,通常有花 3 朵,稀简化为单花,或 2 次分枝有花 5—7 朵;花序梗纤细如丝状。花萼杯状,顶端近截头状。

46. 钩毛紫珠 (新拟) 图 40

Callicarpa peichieniana Chun et S. L. Chen, nom. nov.——*Premna peii* Chun ex H. T. Chang, 中山大学学报(自然科学版) 1: 32. 1960, syn. nov.

灌木,高约 2 米;小枝圆柱形,细弱,密被钩状小糙毛和黄色腺点。叶菱状卵形或卵状椭圆形,长 2.5—6 厘米,宽 1—3 厘米,两面无毛,密被黄色腺点,顶端尾尖或渐尖,基部宽楔形或钝圆,侧脉 4—5 对,细脉不明显,边缘上半部疏生小齿;叶柄极短或无柄。聚伞花序单一(稀少 2 次分枝),有花 1—7 朵,花序梗纤细,长 1—2 厘米,被毛同小枝;花柄细弱,长约 4 毫米;苞片线形;花萼杯状,长约 1.5 毫米,顶端截头状,被黄色腺点;花冠紫红色,被细毛和黄色腺点;花丝与花冠等长或稍长,花药长圆形,药室纵裂;子房球形,无毛,具稠密腺点,花柱长于雄蕊。果实球形,径约 4 毫米,熟时紫红色,具 4 个分核。花期 6—7 月,果期 8—11 月。

产广东、广西、湖南。生于林中或林边。模式标本采自广东。

本种小枝密被钩状小糙毛和黄色腺点;叶片较小,卵形或卵状椭圆形,长 2.5—6 厘米,宽 1—3 厘米;花序极简化,花序梗纤细如丝状,花柄较长等特征与本属其他种明显不同。但其花序腋生,花冠整齐 4 裂,4 雄蕊等长,柱头圆球形,成熟的果实有 4 个分核等性状,均为紫珠属 (*Callicarpa* Linn.) 所固有,而非豆腐柴属 (*Premna* Linn.) 的特征。豆腐柴属的主要特征是花序顶生,花冠多少呈二唇形,4 雄蕊通常 2 长 2 短,柱头常 2 裂,成熟的果实为核果,无明显的 4 分核。张宏达 1960 年在《中山大学学报》上,根据广东黄志 42612 号,冯钦、曾沛 11058 号,谭英华 249 号,广西曾怀德 24417 号等标本发表的“裴氏腐婢 (*Premna peii* Chun ex H. T. Chang)”均具有上述紫珠属的特征,而无上述豆腐柴属的特征,故应归入本种。这种植物普遍分布于广东、广西及湖南的南部;早在 1931 年,陈焕镛曾将广东梁向日 61191 号,左景烈 22690 号,高锡朋 51049 号,陈念劬