

中国高等植物图鉴 3: 590. 图 5134. 1974.

直立或攀援灌木, 高 1—2 米; 幼枝、叶柄及花序略被棕褐色或暗灰色茸毛。叶片纸质,




图 45 塘虱角 *Premna sunyiensis* P'ei
(史渭清绘)

卵形至卵状披针形, 长 3—7.5 厘米, 宽 1—4.5 厘米, 全缘, 顶端渐尖, 基部阔楔形或近圆形, 两面近无毛, 背面有褐色腺点, 侧脉 3—5 对, 在叶背面凸起; 叶柄长 0.6—2 厘米, 上面有纵沟。顶生塔形圆锥花序长 5—12 厘米, 宽 2.5—4 厘米; 苞片线状披针形或线形, 长 2—6 毫米, 有茸毛; 花萼长约 1.5 毫米, 结果时稍增大, 在花蕾时有毛, 以后变无毛, 外面有褐色腺点, 有明显纵脉, 顶端 5 浅裂, 裂片钝三角形; 花冠淡黄色, 花冠管长约 7 毫米, 顶端 4 裂微呈二唇形, 上唇凹入, 下唇 3 裂, 裂片椭圆形, 中间裂片长 1.5—2 毫米, 两侧裂片较短, 管内喉部有白色长柔毛; 雄蕊 4, 2 长 2 短; 花药肾形, 棕色; 子房无毛, 顶端密生褐色腺点。核果倒卵球形, 有褐色腺点, 熟时暗红色, 直径约 4 毫米。花果期 5—10 月。

产广东。生山地、山坡林缘。模式

标本采自广东乳源。

全株可作牲畜药, 能消肿止痛、消积杀虫、祛寒痰和寒湿(《广东中兽医常用草药》)。

本种与长序豆腐柴 *P. fordii* Dunn 近似, 但后者全体密生长柔毛, 花萼及花冠在花后均被茸毛等性状可以区别。

6. 黄药 (中国高等植物图鉴)

Premna cavaleriei Lévl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. 10: 439. 1912; P'ei in Mem. Sci. Soc. China 1 (3): 87. 1932; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 324. 1934; 中国高等植物图鉴 3: 591. 图 5135. 1974; — *Clerodendrum elachistanthum* Merr. ex Li in Journ. Arn. Arb. 25: 426. 1944, syn. nov.

小乔木至乔木, 高 4—9 米; 树皮暗灰色, 小枝圆柱形, 幼时赤褐色, 密生短绒毛, 老后变无毛, 有细小椭圆形皮孔。叶片薄纸质, 卵形或卵状长椭圆形, 长 9—15 厘米, 宽 (3.5)—5—9 厘米, 同对叶常不同形, 全缘, 顶端渐尖至钝, 基部阔楔形、圆形、截平或近心脏形, 两面疏生茸毛或近无毛, 背面有不明显的腺点; 叶柄疏被茸毛或近无毛, 长 2—5 厘

米,同对叶柄常不等长。圆锥状聚伞花序顶生,密生茸毛,有疏散开展的分枝,长11—32厘米,宽8—15厘米;花萼钟状,长1—2.5毫米,外面密生茸毛和不明显的腺点,顶端5裂,略呈二唇形,裂齿钝三角形;花冠淡黄色,4裂近二唇形,裂片向外开展,外面疏生茸毛和密生腺点,花冠管长2—3毫米,喉部密生长柔毛;雄蕊4,2长2短;子房无毛,顶端密生黄色腺点。核果卵球形,径约2毫米。 花果期5—7月。

产江西(井冈山)、湖南(江永县、云峰山区、黔阳县)、广东、广西、贵州。生于海拔约800米的山坡及路边疏林中。模式标本采自贵州平坝。

7. 尖叶豆腐柴 (云南植物志)

Premna chevalieri P. Dop. in Bull. Soc. Bot. France 70: 445. 1923 et in Lecomte, Fl. Gén. L'Indo-Chine 4: 813. f. 87, 6. 1935, excl. syn. *Premna acuminatissima* Merr. (1930) et P'ei (1932); 云南植物志 1: 421. 图版 100, 5—7. 1977. —*Premna acuminatissima* Merr. in Univ. Calif. Publ. 10: 430. 1924, non Merr. in Lingn. Sci. Journ. 6: 284. 1930.

灌木至乔木,高2—5米;小枝圆柱形,嫩枝明显被微柔毛,老时变无毛,棕褐色,有条纹。叶片坚纸质至近革质,有光泽,卵形或椭圆状卵形,长5—9厘米,宽3—4—(5)厘米,同对叶片常不同大小,顶端渐尖或尾尖,基部楔形或圆形,常不对称,两面无毛或背面被稀疏微柔毛,全缘或在基部有不明显的细锯齿,侧脉4—5对,近基部3出,在两面均明显隆起;叶柄纤细,被毛,长(1)—2.5—3厘米,同对叶柄常不等长。顶生圆锥花序疏散,被微柔毛,长达25厘米,宽达10厘米,基部苞片叶状,上部小苞片线形,被毛;花柄长约1毫米;花由黄变白色,有紫色斑点;花萼长约1毫米,5浅裂,略呈二唇形,裂片近三角形,有腺点;花冠长约5毫米,外面被腺点和短毛,二唇形,上唇圆形,全缘,下唇3浅裂,裂片圆形,喉部被毛;雄蕊4,2长2短,着生于花冠管中部,与花冠等长;花药近球形,个字着生;子房无毛,有腺点;花柱长约5毫米,有稀疏腺点,柱头2浅裂。核果黑色,直径约(4.5)—5毫米,果萼增大1倍。

产广东海南岛与云南东南部。生于海拔800—1100米的山坡、路旁疏林中。越南北方、老挝也有分布。

本种同对叶片不同大小,且叶柄不等长似黄药 *P. cavaleriei* Lévl., 但黄药的叶片薄纸质,花萼密生茸毛;核果直径约2毫米,仅顶部有腺点等性状可以区别。

8. 滇桂豆腐柴 (云南植物志) 图版 10: 1—4

Premna confinis P'ei et S. L. Chen ex C. Y. Wu, 云南植物志 1: 437. 图版 104, 1—2. 1977.

常绿灌木至小乔木,高1.5—6米;小枝圆柱形,栗褐色,密被糠枇状腺点,无毛,较密被点状至线形皮孔。叶片革质,长圆形至披针形,稀椭圆形,长9—16厘米,宽3.5—8厘米,顶端急尖至短渐尖,基部楔形略下延,全缘或波状,干时表面带暗褐色,无毛,背面较